В. В. СКОПЕНКО, О. Н. МИРОШНИКОВ, Л. В. ГЛУЩЕНКО, А. К. ТРОФИМЧУК

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРХЛОРАТА
КОБАЛЬТА(II) С АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ ОСНОВАНИЯМИ
В ПРОПАНДИОЛ-1,2-КАРБОНАТЕ

При растворении перхлората кобальта(II) в метаноле, ацетонитриле и диметилформамиде образуются октаэдрические комплексы с некоординируемыми ClO_4^- -группами [1—4]. Добавка хлорид- или бромид-ионов к указанным растворам вызывает образование различных тетраэдрических и октаэдрических равновесных форм комплексов [5]. При кристаллизации метанольных или ацетоновых растворов, содержащих перхлорат кобальта(II), выделены $[\text{Co}(\text{CH}_3\text{OH})_6](\text{ClO}_4)_2$ и $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_4(\text{CH}_3\text{OH})_2](\text{ClO}_4)_2$ [6—8].

Целью настоящей работы является исследование взаимодействия перхлората кобальта(II) с аминами в пропандиол-1,2-карбонате (ПК). Сведения об этом взаимодействии в литературе отсутствуют.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для изучения комплексобразования в пропандиол-1,2-карбонате, содержащем на 1 моль $\text{Co}(\text{ClO}_4)_2$ от 0,1 до 100 моль 3-бромпиридина (3-BrPy), хинолина (Quin), изохинолина (*i*-Quin), пиридина (Py), акридина (Act), бензимидазола (Bim), 3-аминопиридина (3-NH₂Py), 2-аминопиридина (2-NH₂Py), третичного бутиламина (ТБА) и диэтиламина (ДЭА), использовали $\text{Co}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ марки «ч.д.а.». Водный перхлорат кобальта(II) растворяли в ПК и хранили в течение нескольких суток над цеолитами марки NaA 4A, предварительно прокаленными при 500°. После фильтрования получен раствор безводного перхлората кобальта(II) в ПК, который сохраняли с соблюдением необходимых предосторожностей от попадания влаги воздуха. Согласно данным анализа по Фишеру, содержание следов воды в растворе не превышает 0,005%.

Очистка аминов проведена по известным методикам [9, 10]. Пропандиол-1,2-карбонат выдерживали в течение нескольких суток над CaH_2 и дважды перегоняли под вакуумом.

Для полученных в растворе комплексов изучены электронные спектры поглощения в области 28 000—6000 см^{-1} . Запись спектров проводили на приборе «Perkin-Elmer». Измерения оптической плотности выполнены для растворов с постоянной концентрацией перхлората кобальта(II) (0,02 или 0,007 моль/л) в переменной концентрации монодентатного азотистого основания (0,01—3 или 0,002—1 моль/л) соответственно. Растворы сравнения содержали в ПК амины той же концентрации, что и исследуемые растворы.

На рис. 1 в качестве примера приведены данные, полученные при спектрофотометрическом исследовании растворов $\text{Co}(\text{ClO}_4)_2$ — ТБА — ПК при $\lambda = 575$ нм. Для нахождения состава и расчета констант равновесия реакций образования аминых комплексов данные, приведенные на

Рис. 1. Зависимость оптической плотности растворов $\text{Co}(\text{ClO}_4)_2$ — ТБА — ПК от концентрации добавленного амина при $\lambda = 575$ (а), 600 нм (в) и результаты определения состава образующихся комплексов (б, г)

рис. 1, а, обрабатывались методом ограниченного логарифмирования [11]. Как видно из рис. 1, б, в изученных концентрационных условиях обнаружен комплекс с соотношением $[\text{Co}] : [\text{ТБА}]$ равным $1 : 1$. При $\lambda = 600$ нм в этой системе обнаруживается комплекс с соотношением $[\text{Co}] : [\text{ТБА}] = 1 : 4$ (рис. 1, в, г). Отклонения при измерении оптической плотности двух параллельных серий растворов при одной длине волны составляли не более $0,01$. Точность в определении констант равновесия составляет $\pm 0,1$ ед. $\lg K$.

Подобная картина наблюдается и при исследовании других систем $\text{Co}(\text{ClO}_4)_2$ — Amin — ПК.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 1 приведены значения логарифмов констант равновесия, соответствующие присоединению одной молекулы монодентатного азотистого основания к перхлорату кобальта(II):

Как правило, основной вклад в энергию связи металл—лиганд вносит неподеленная пара электронов атомов азота амина, а в узком интервале изменения значений констант ковалентности rK_0 оснований энергия связи определяется величиной $d_{\text{дл}}$ — $p_{\text{д}}$ -взаимодействия [12—14]. Однако на основании данных [15] можно предположить, что и в широком интервале изменения rK_0 лигандов существенна роль вклада π -электронов в энергию связи металл — лиганд, что согласуется с полученными в данной работе

Таблица 1

Устойчивость комплексов $[\text{Co}(\text{Amin})(\text{ПК})_5]^{2+}$ в пропандиол-1,2-карбонате

Амин	$\text{p}K_{\text{д}}$	$\lg K_1$	Амин	$\text{p}K_{\text{д}}$	$\lg K_1$
3-бромпиридин	3,0	0,6	Акридин	5,6	1,5
Хинолин	4,8	1,1	2-аминопиридин	6,9	1,3
Изохинолин	5,0	1,7	Третичный бутиламин	10,4	1,5
Пиридин	5,2	1,3	Диэтиламин	10,9	1,8

значениями констант равновесий. Так, изохинолин образует более устойчивые или сравнимые по прочности соединения с перхлоратом кобальта(II), чем третичный бутиламин или диэтиламин соответственно, хотя последние являются гораздо более сильными основаниями (табл. 1).

Согласно теории кристаллического поля, для шестикоординационных соединений кобальта(II) в видимой и ИК области должны наблюдаться переходы ${}^4T_{1g}(F) \rightarrow {}^4T_{2g}(F)$, ${}^4T_{1g} \rightarrow {}^4A_{1g}(F)$, ${}^4T_{1g} \rightarrow {}^4T_{2g}(F)$ [16]. Четырехкоординационные комплексы кобальта(II) характеризуются гораздо более интенсивными переходами в видимой и ближней ИК области ${}^4A_1 \rightarrow {}^4T_1(F)$ в ${}^4A_1 \rightarrow {}^4T_1(F)$. Как видно из рис. 2, в спектре раствора перхлората кобальта(II) в ПК положение полос и их малая интенсивность согласуется с шестикоординационным строением внутренней координационной сферы комплекса. По сравнению со спектром $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ ($\nu_1 = 20\,000 \text{ см}^{-1}$, $\nu_2 = 8350 \text{ см}^{-1}$ [16]) в спектре пропандиол-1,2-карбонатного раствора перхлората кобальта(II) наблюдается смещение полос поглощения на $100\text{--}500 \text{ см}^{-1}$. Исследование спектров поглощения перхлората кобальта(II) при различных концентрациях указывает на наличие в растворе только одной координационной формы $[\text{Co}(\text{ПК})_5]^{2+}$.

Положение полос поглощения и их малая интенсивность (табл. 2) позволяют предположить для всех комплексов кобальта(II) с аминами в растворе с соотношением $[\text{Co}] : [\text{Amin}] = 1 : 1$ координационное число 6, т. е. состав $[\text{Co}(\text{Amin})(\text{ПК})_5]^{2+}$. В спектрах растворов перхлората кобальта(II) с увеличением молярных отношений $[\text{Py}] : [\text{Co}]$ наблюдается гипсохромное смещение и возрастание интенсивности максимума поглощения полосы ν_2 в 2 раза (табл. 2, рис. 2), что связано с образованием менее симметричных координативных частиц $[\text{Co}(\text{Py})_x(\text{ПК})_{6-x}]^{2+}$. При соотношении $[\text{Py}] : [\text{Co}] > 100$ положение и интенсивность максимума поглощения полосы ν_2 не изменяются, что свидетельствует об образовании комплекса с максимально возможным числом молекул координированного пиридина. Однако электронный спектр данного соединения отличается от электронного спектра поглощения безводного перхлората кобальта(II) в абсолютном пиридине (табл. 2). Для последнего характерно гипсохромное смещение полосы ν_1 и уменьшение ν_2 в 3 раза по сравнению со спектром раствора $[\text{Py}] : [\text{Co}] > 100$ в ПК, что связано, вероятно, с образованием в растворе абсолютного пиридина ионов $[\text{Co}(\text{Py})_6]^{2+}$. Тогда более низкая симметрия первых соединений позволяет предположить вхождение наряду с молекулами пиридина молекул ПК во внутреннюю координационную сферу комплекса $[\text{Co}(\text{Py})_x(\text{ПК})_{6-x}]^{2+}$.

Спектры изохинолиновых, хинолиновых и 3-бромпиридиновых комплексов аналогичны спектрам соответствующих пиридиновых комплексов (табл. 2).

Спектры поглощения растворов при молярных отношениях $[\text{TBA}] : [\text{Co}] > 1$ существенно отличаются по интенсивности и характеру погло-

Рис. 2. Электронные спектры поглощения комплексов, образующихся в растворе $\text{Co}(\text{ClO}_4)_2$ и ПК (1) при добавлении Pu до $[\text{Co}] : [\text{Pu}] = 1 : 1$ (2) и $1 : 100$ (3)

Рис. 3. Электронные спектры поглощения комплексов, образующихся в растворе $\text{Co}(\text{ClO}_4)_2$ и ПК (1) при добавлении TBA до $[\text{Co}] : [\text{TBA}] = 1 : 1$ (2), $1 : 2$ (3), $1 : 100$ (4)

щения (рис. 3) от спектров вышеприведенных соединений. Спектры растворов, содержащих на 1 моль $\text{Co}(\text{ClO}_4)_2$ не более 1 моля TBA, идентичны спектрам $[\text{Co}(\text{ПК})_6]^{2+}$ и вышеприведенных соединений. Согласно данным по составу комплексов, в этих условиях образуются комплексы $[\text{Co}(\text{TBA})_5(\text{ПК})]^{2+}$ (табл. 4). Однако при добавлении большего количества аммиака характер поглощения изменяется (рис. 3). Положение полос поглощения и их интенсивность позволяют сделать вывод об образовании в растворе частиц с координационным числом 4. При варьировании концентраций TBA в растворе перхлората кобальта(II) изменяется положение и интенсивность

Таблица 2

Характеристики электронных спектров поглощения исследованных систем в ПК

Молярные соотношения	$\frac{\nu_{\max}}{(\epsilon_{\max})^2} \frac{\text{cm}^{-1}}{\text{M}^2 \text{cm}^{-1} \text{g}^{-1} \text{cm}^{-1}} (P) \rightarrow$ $\rightarrow \sigma_{1g}^2 (P)$	$\frac{\nu_{\max}}{(\epsilon_{\max})^2} \frac{\text{cm}^{-1}}{\text{M}^2 \text{cm}^{-1} \text{g}^{-1} \text{cm}^{-1}} (P) \rightarrow$ $\rightarrow \sigma_{2g}^2 (P)$	$\frac{\nu_{\max}}{(\epsilon_{\max})^2} \frac{\text{cm}^{-1}}{\text{M}^2 \text{cm}^{-1} \text{g}^{-1} \text{cm}^{-1}} \rightarrow$ $\rightarrow \sigma_{1g} (P)$	$\frac{\nu_{\max}}{(\epsilon_{\max})^2} \frac{\text{cm}^{-1}}{\text{M}^2 \text{cm}^{-1} \text{g}^{-1} \text{cm}^{-1}} \rightarrow$ $\rightarrow \sigma_{1g} (P)$
Co(ClO ₄) ₂ в ПК	19400 (15)	8200 (15)	—	—
[Co(ClO ₄) ₂] : [3-BrPy] = 1:1	19500 (20)	8300 (5) 7200 (5) 6700 пл *	—	—
[Co(ClO ₄) ₂] : [3-BrPy] = 1:100	20500 (30)	8900 (5) 8100 (10)	—	—
[Co(ClO ₄) ₂] : [Quin] = 1:1	18100 (15)	8200 (5) 7200 (5) 6500 (5)	—	—
[Co(ClO ₄) ₂] : [Quin] = 1:100	19000 (50)	8800 (10) 7400 (10) 6300 пл	—	—
[Co(ClO ₄) ₂] : [i-Quin] = 1:1	18300 (30)	8300 (5) 7300 пл 6200 пл	—	—
[Co(ClO ₄) ₂] : [i-Quin] = 1:100	20600 (40)	9000 (5)	—	—
[Co(ClO ₄) ₂] : [Py] = 1:1	19500 (25)	8300 (5) 7000 пл 6100 пл	—	—
[Co(ClO ₄) ₂] : [Py] = 1:100	20300 (30)	9100 (5) 8100 пл	—	—
Co(ClO ₄) ₂ в абс. хлороформе	19200 (50)	8400 (15) 7300 (15)	—	—
Co(ClO ₄) ₂ в абс. дихлорметане	20300 (10)	9100 (5) 7300 пл	—	—
Co(ClO ₄) ₂ в абс. пиридине	21300 (10)	9100 (5) 8700 (5)	—	—
[Co(ClO ₄) ₂] : [AcF] = 1:1	19500 (10)	8200 (5) 7100 (5) 6600 (5) 6100 пл	—	—
[Co(ClO ₄) ₂] : [AcF] = 1:100	—	—	20300 (90) 17300 (80)	8400 (5) 7800 (5)
[Co(ClO ₄) ₂] : [Bim] = 1:1	19300 (20)	8300 (5) 8900 пл 6200 пл	—	—
[Co(ClO ₄) ₂] : [Bim] = 1:100	—	—	18600 пл 17600 (600)	9100 (150)
[Co(ClO ₄) ₂] : [3-NH ₂ Py] = 1:1	19400 (30)	9100 (5) 8400 (5) 7300 пл	—	—
[Co(ClO ₄) ₂] : [3-NH ₂ Py] = 1:100	—	—	20200 пл 18200 (100) 17800 (100)	9500 пл 8000 (15) 7200 пл 6300 пл

Таблица 2 (окончание)

Молярное соотношение	$\nu_1, \text{см}^{-1}$ ($^4T_1(F) \rightarrow$ $\rightarrow ^4T_{1g}(P)$)	$\nu_1, \text{см}^{-1}$ ($^4A_2 \rightarrow$ $\rightarrow ^4T_{2g}(F)$)	$\nu_1, \text{см}^{-1}$ ($^4A_2 \rightarrow$ $\rightarrow ^4T_1(P)$)	$\nu_1, \text{см}^{-1}$ ($^4A_2 \rightarrow$ $\rightarrow ^4T_1(P)$)
$[\text{Co}(\text{ClO}_4)_2] : [2\text{-NH}_2\text{Py}] = 1:1$	19100 (25)	8900 пл 8200 (5) 7200 (5) 6600 (5)	—	—
$[\text{Co}(\text{ClO}_4)_2] : [2\text{-NH}_2\text{Py}] = 1:100$	—	—	19300 (160) 17800 пл	10500 (15) 7200 (20) 6500 (20)
$[\text{Co}(\text{ClO}_4)_2] : [\text{ТБА}] = 1:1$	19100 (20)	7800 (5) 6900 пл	—	—
$[\text{Co}(\text{ClO}_4)_2] : [\text{ТБА}] = 1:100$	—	—	19100 (80) 17800 (80)	8200 (15)
$[\text{Co}(\text{ClO}_4)_2] : [\text{ДЭА}] = 1:1$	19000 (15)	8200 (5) 7200 (5) 6700 (5)	—	—
$[\text{Co}(\text{ClO}_4)_2] : [\text{ДЭА}] = 1:100$	—	—	18500 пл 17800 (80)	8300 (10) 7700 пл 7200 (10) 6400 (10)

* 6700 см^{-1} — положение пика в электронном спектре поглощения комплекса.

максимумов поглощения, что можно связать с наличием в растворе нескольких равновесных форм комплексов. По достижении 100-кратного избытка амина увеличение концентраций ТБА не изменяет спектр поглощения. В этих условиях в растворе образуются только ионы $[\text{Co}(\text{TBA})_4]^{2+}$.

Аналогичные изменения наблюдаются в спектрах ПК растворов перхлората кобальта(II) при содержании аминов в молярных соотношениях $[\text{Amin}] : [\text{Co}] > 1$, где Amin — бензамидоол, акридин, 2-аминопиридин, 3-аминопиридин, ДЭА (табл. 2).

Расчет параметров кристаллического поля комплексов проводился по методу, описанному в работах [17—19].

В табл. 3 приведены значения энергий переходов $^4A_2 \rightarrow ^4T_1(F)$, $^4A_2 \rightarrow ^4T_1(P)$, $^4T_{1g} \rightarrow ^4T_{2g}(F)$, которые были вычислены как центры тяжести сложных электроин-колебательных полос в спектрах комплексов кобальта(II) и использованы для расчета параметров кристаллического поля. Положение полос поглощения, соответствующей переходу $^4T_{1g} \rightarrow ^4A_{2g}(F)$, в спектрах $[\text{Co}(\text{Amin})_x(\text{ПК})_{6-x}]^{2+}$ принято равным $18Dq$.

Согласно значениям Dq для комплексов $[\text{Co}(\text{Amin})_x(\text{ПК})_{6-x}]^{2+}$, сила поля лигандов изменяется в ряду: изохинолин $>$ 3-бромпиридин $>$ пиридин $>$ хинолин. Аналогично для соединений $[\text{Co}(\text{Amin})_4]^{2+}$: акридин $>$ 3-аминопиридин $>$ бензамидоол $\sim$ 2-аминопиридин $>$ ДЭА $>$ ТБА (табл. 3). Как видим, нет даже качественной корреляции между изменением силы поля лигандов и величиной rK_a амина (табл. 1), что свидетельствует о значительном вкладе $d_{\pi} - p_{\pi}$ -взаимодействия в общую связь металл-лиганд [20].

Для построения корреляции между величиной параметра нефелоксещности β , который характеризует степень делокализации электронов с металла на лиганд, и свойствами лиганда необходимо выбрать теоретически рассчитанный параметр, который характеризовал бы электронное строение рассмотренных выше азотсодержащих оснований. Выбор такого

Таблица 3

Параметры кристаллического поля и вычисленные значения энергии π -разрыхляющих уровней лигандов для комплексов кобальта(II)

Комплекс	$T_{2g}(F)$, см ⁻¹	$A_{1g}(F)$, см ⁻¹	$T_{1g}(F)$, см ⁻¹	$T_{2g}(F)$, см ⁻¹	d_{π} , см ⁻¹	β , см ⁻¹	λ	E_{π} , эВ
[Co(ПК) ₆] ²⁺	8400	16900	—	—	1060	460	0,44	—
[Co(3-BrPy) ₃ (ПК) ₃] ²⁺	8800	16800	—	—	1100	490	0,48	—
[Co(Py) ₆ (ПК) ₃] ²⁺	8700	16600	—	—	1080	480	0,47	-1,34
[Co(i-Quin) ₃ (ПК) ₃] ²⁺	9100	20600	—	—	1140	460	0,46	-2,22
[Co(Quin) ₃ (ПК) ₃] ²⁺	8400	16900	—	—	1050	430	0,42	-2,37
Co(Acr) ₃ ²⁺	—	—	10500	18400	580	770	0,75	-3,07
Co(Bim) ₃ ²⁺	—	—	9200	18100	610	800	0,78	-1,64
[Co(3-NH ₂ Py) ₃] ²⁺	—	—	9400	18800	620	840	0,81	-1,20
[Co(2-NH ₂ Py) ₃] ²⁺	—	—	9100	19200	510	870	0,84	-1,14
[Co(TBA) ₃] ²⁺	—	—	8200	18600	460	—	—	—
[Co(DЭА) ₃] ²⁺	—	—	8300	18800	460	—	—	—
Co(ClO ₄) ₂ в Py	9100	20600	—	—	1140	510	0,49	-1,34
Co(ClO ₄) ₂ в i-Quin	9000	20200	—	—	1120	460	0,45	-2,22
Co(ClO ₄) ₂ в Quin	8600	19100	—	—	1080	430	0,42	-2,37

параметра можно сделать на основании следующих рассуждений. Из литературных данных известно [21—23], что π -дативные связи в комплексах переходных металлов с аминами образуются за счет переноса электронов с d_{π} -орбиталей металла на пустые π^* -разрыхляющие орбитали лигандов. Следовательно, в первом приближении можно использовать значения энергии этих орбиталей для оценки величины $d_{\pi} - p_{\pi}$ -взаимодействия. Расчет положения π -уровней в лигандах проведен методом молекулярных орбиталей в полуэмпирическом приближении самосогласованного поля на ЭВМ М-220М. Использовалась программа [24]. Возмущение π -уровней органических реагентов при взаимодействии с металлом учитывалось, как описано в [25, 26].

В табл. 3 приведены значения энергии π -орбиталей лигандов, которые ответственны за образование $d_{\pi} - p_{\pi}$ -связей в комплексах, а также значения параметра β и параметра λ в параметра β , установленные эмпирически по спектроскопическим данным.

Очевидно, что чем ближе по энергии будут находиться π^* -разрыхляющие орбитали лигандов, тем больше возможность для образования более стабильных π -дативных связей, а значит, тем в большей степени будет осуществляться делокализация электронов с металла на лиганд. Как следует из данных табл. 3, увеличенные степени ковалентности связи металл — лиганд для комплексов [Co(Аmin)₃(ПК)₃]²⁺ замещается в ряду 3-бромпиридин < пиридин < пикнолилин < хиволин, что коррелирует с положением π^* -разрыхляющих уровней в лигандах. Аналогичная корреляция наблюдается для других комплексов (табл. 3).

ЛИТЕРАТУРА

1. V. Jedinakova, Sb. VSGHT Praha, B17, 81 (1973).
2. Z. Luz, J. Chem. Phys., 41, 1748, (1964).
3. W. Lihus, Electrochim. Acta, 16, 1749 (1971).
4. N. A. Matviyoff, Inorg. Chem., 5, 788 (1966).
5. В. Гутман, Химия координационных соединений в неводных растворах. «Мир», М., 1971.
6. A. D. Schenau, V. Ingen. Rec. trav. chim., 91, 88 (1972).
7. V. Gutman, H. Schmidt, Monatsh. Chem., 105, 653 (1974).
8. И. Шумаер, Перхлораты, свойства, проводимость и применение. М., 1963.

9. А. Вайсбергер, Э. Прослауэр, Дж. Риддик, Э. Туно. Органические растворители. ИЛ, М., 1958.
10. А. Гордон, Р. Форд. Спутник химика. «Мир», М., 1976.
11. Спектроскопические методы в химии комплексных соединений. Под ред. В. М. Вдовенко. «Химия», Л., 1964.
12. J. O. Cabral, H. C. A. King, S. M. Nelson, T. M. Shepherd. *J. Chem. Soc., A*, 1348 (1966).
13. H. C. A. King, E. Kibon, S. M. Nelson. *J. Chem. Soc., A*, 4832 (1964).
14. H. C. A. King. *J. Chem. Soc.*, 5446 (1963).
15. О. Н. Мыршников. Автореферат канд. дис., Киев, 1976.
16. К. Бальхаузен. Введение в теорию поля лиганда. «Мир», М., 1984.
17. L. Carlin. *Transition metal chemistry*, 1, 32 (1965).
18. F. A. Cotton, D. M. L. Goodgame, M. Goodgame. *J. Amer. Chem. Soc.*, 83, 4650 (1961).
19. Y. Tanabe, S. Sugano. *J. Phys. Soc. Japan*, 9, 753 (1954).
20. Е. М. Шусторович. Химическая связь в координационных соединениях. «Знание», М., 1975.
21. P. Day, N. Sanders. *J. Chem. Soc., A*, 1530 (1967).
22. P. Day, N. Sanders. *J. Chem. Soc., A*, 1536 (1967).
23. M. M. Dhingra. *Chem. Phys. Lett.*, 10, 86 (1971).
24. Г. И. Каган, И. Ф. Фундальер, Г. М. Каган. Теор. и экспер. химия, 2, 589 (1966).
25. H. L. Schlafer, E. König. *Z. phys. Chem., N. F.*, 30, 145 (1961).
26. Л. И. Саврацкий. Химия гетероцикл. соед., 4, 520 (1972).

Киевский государственный
университет им. Т. Г. Шевченко

Поступила в редакцию
16 ноября 1977 г.