УДК 543.422.5 : 546.831

© 1990 г.

М. И. ШТОКАЛО, Е. Е. КОСТЕНКО

**КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
ЦИРКОНИЙ — ПРОПИЛДИАНТИПИРИЛМЕТАН —
ЭРИОХРОМОВЫЙ ЧЕРНЫЙ Т**

Разнолигандные комплексы благодаря возможности различных комбинаций реагентов применяют для повышения чувствительности и селективности фотометрического определения циркония и других металлов [1—3]. В качестве хромофорного реагента в этих комплексах часто используют металлохромные индикаторы (ксиленоловый оранжевый, метилтимоловый синий, эриохромцианин, арсеназо III, СФАДНС, эриохромовый черный Т, бромпирогаллоловый красный и др.). С одной стороны, эти реагенты образуют с ионами циркония окрашенные комплексы, способные разрушаться под действием производных пиразолон и других органических оснований (например, ксиленоловый оранжевый, метилтимоловый синий, эриохромцианин). С другой — ряд металлохромных реагентов (эриохромовый черный Т, СФАДНС, бромпирогаллоловый красный) выступает в качестве лигандов, находящихся в координационной сфере разнолигандного комплекса совместно со вторым лигандом, например, с пропилдиантипирилметаном (ПДАМ). Можно предположить, что в последнем случае константа сопропорционирования, которая является мерой совместности разнородных лигандов в одной и той же координационной сфере, больше единицы [1].

Комплексообразование циркония с ПДАМ изучено нами ранее по равновесию с ксиленоловым оранжевым [4]. В этом случае окрашенный комплекс циркония с ксиленоловым оранжевым разрушался под действием прибавляемого лиганда. Введение в систему цирконий — ПДАМ другого металлохромного индикатора — эриохромового черного Т (ЭХЧ) привело к батохромному смещению полосы поглощения, а следовательно, к образованию соединения, содержащего три компонента: цирконий, ПДАМ, ЭХЧ.

Цель данной работы — разработка методики определения циркония в виде указанного разнолигандного комплекса.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Использовали исходный раствор $ZrCl_4$ в 5 М НСl, стандартизованный гравиметрически; рабочий 10^{-3} М раствор соли циркония готовили разбавлением исходного 1 М НСl. 10^{-3} М раствор ЭХЧ готовили растворением препарата х. ч. в смеси (1:1) вода—этанол; 10^{-1} М раствор ПДАМ — растворением точной навески основания в CH_3COOH (1:1). Оптическую плотность измеряли на СФ-26 и ФЭК-56, рН контролировали на ЛПУ-01.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Условия образования комплекса. Комплексообразование циркония с ЭХЧ [5] и циркония с ПДАМ [4] изучено ранее. Чувствительность реакции циркония с ЭХЧ сравнительно невелика ($\epsilon = 1,8 \cdot 10^4$). Введение в си-

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 1. Спектры светопоглощения хлороформных экстрактов разнолигандного (1) и бинарного комплексов (2), ассоциата (3) и ЭХЧ (4)

$c_{Zr} = 1 \cdot 10^{-5}$ М, $c_{ПДАМ} = 2 \cdot 10^{-2}$ М, $c_{ЭХЧ} = 4 \cdot 10^{-4}$ М, 1 М НСl, $l = 0,5$ см

Рис. 2. Зависимость оптической плотности хлороформных экстрактов разнолигандного комплекса от рН (1), концентраций ПДАМ (2) и ЭХЧ (3)

$c_{Zr} = 1 \cdot 10^{-5}$ М, $c_{ПДАМ} = 2 \cdot 10^{-2}$ М, $c_{ЭХЧ} = 4 \cdot 10^{-4}$ М, 1 М НСl, 610 нм, $l = 0,5$ см

Рис. 3. Спектры светопоглощения хлороформных экстрактов разнолигандных комплексов циркония с ДАМ (1), МДАМ (2), ПДАМ (3), ГДАМ (4) и ФДАМ (5)

$c_{Zr} = 1 \cdot 10^{-5}$ М; $c_{ПДАМ} = 2 \cdot 10^{-2}$ М; $c_{ЭХЧ} = 4 \cdot 10^{-4}$ М, 1 М НСl, $l = 0,5$ см

стему ПДАМ приводит к гиперхромному эффекту и батохромному смещению полосы поглощения комплекса циркония с ЭХЧ (рис. 1). Образующийся разнолигандный комплекс извлекается органическими растворителями. Наилучшим экстрагентом является хлороформ.

На рис. 2 приведены зависимости оптической плотности экстрактов разнолигандного комплекса циркония с ПДАМ и ЭХЧ от рН и концентраций взаимодействующих компонентов. Видно, что для концентрации циркония $1,0 \cdot 10^{-5}$ М оптимальными являются 1 М НСl, $2,0 \cdot 10^{-2}$ М ПДАМ, $4,0 \cdot 10^{-4}$ М ЭХЧ. Данные по влиянию ДАМ, МДАМ, ПДАМ, ГДАМ и ФДАМ (диантипирилметан, метил-, пропил-, гексил- и фенилдиантипирил-

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 4. Результаты определения состава комплекса в системе цирконий — ПДАМ (1) — ЭХЧ (2) методом сдвига равновесия

Рис. 5. Зависимость $-\lg B = f(\text{pH})$ комплексобразующий ион: 1 — Zr^{4+} ; 2 — $\text{Zr}(\text{OH})^{3+}$; 3 — $\text{Zr}(\text{OH})_2^{2+}$; 4 — $\text{Zr}(\text{OH})_3^+$

метан соответственно) на изменение окраски экстракта изучаемого комплекса представлены на рис. 3. Наилучшие результаты получены в случае использования ПДАМ.

Состав комплекса циркония с ПДАМ и ЭХЧ установлен методом сдвига равновесия: соотношение компонентов цирконий : ПДАМ : ЭХЧ = 1 : 2 : 2 (рис. 4). Эти данные соответствуют результатам машинной обработки по методу наименьших квадратов. Факт экстракции разнолигандного комплекса циркония с ПДАМ и ЭХЧ свидетельствует об образовании электронейтрального соединения. Это подтверждают опыты с ионообменниками КУ-2 и ЭДЭ-10 П. Эксперимент выполняли следующим образом: исследуемый экстракт, содержащий $1 \cdot 10^{-5}$ М соли циркония, $2 \cdot 10^{-2}$ М ПДАМ и $4 \cdot 10^{-4}$ М ЭХЧ, встряхивали 6 ч с навесками по 1 г катионо- и анионообменников.

Химизм комплексобразования в системе цирконий — ПДАМ — ЭХЧ. Использовали метод Назаренко [6]. Вычисления проводили с учетом гидролиза ионов циркония ($K_{r1}=0,60$; $K_{r2}=0,24$; $K_{r3}=0,09$; $K_{r4}=0,068$ [7]), констант диссоциации ПДАМ ($K_6=2 \cdot 10^{-11}$ [8]) и красителя ($K_1=1,26 \cdot 10^{-4}$ [9]). Взаимодействие циркония с ПДАМ и ЭХЧ можно представить следующим образом

Расчеты проводили по уравнению

$$-\lg B = (gn + p) \text{pH} - \lg \frac{1}{G \gamma \beta} \quad (2)$$

где

$$B = \frac{[\text{Me}(\text{OH})_i^{(4-i)+}] [c_{\text{Ind}} - g c_{\text{к}}]^g [c_{\text{ПДАМ}} - p c_{\text{к}}]^p}{c_{\text{к}} \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_0} + \frac{K_1}{[\text{H}^+]} \right)^g \left(1 + \frac{K_{\text{ПДАМ}}}{[\text{H}^+]} \right)^p} \quad (3)$$

p, g — числа координированных молекул ПДАМ и индикатора соответственно; c_{Ind} ; $c_K = c_{\text{Zr}}(A/A_{\text{max}})$; $c_{\text{ПДАМ}}$ — общие концентрации индикатора, комплекса и ПДАМ соответственно; G, Y — коэффициенты, учитывающие диссоциацию ПДАМ и индикатора; A и A_{max} — оптические плотности при данном значении рН и при полном связывании циркония в комплекс; c_{Zr} — общая концентрация циркония.

Зависимость $-\lg V$ от рН (рис. 5) с целочисленным значением тангенса, угла наклона наблюдается для ионов Zr^{4+} . Таким образом, при образовании разнолигандного комплекса координирующим является ион Zr^{4+} , который вытесняет по одному протону из каждой оксигруппы красителя, находящейся в *орто*-положении к азогруппе. В связи с этим можно предположить образование комплекса $[\text{Zr}(\text{ПДАМ})_2(\text{HR})_2]$.

Методика определения циркония в объекте. На основе полученных данных нами разработан экстракционно-фотометрический метод определения циркония. Закон Бера соблюдается в интервале концентраций циркония $(0,1-10,0) \cdot 10^{-5}$ М, молярный коэффициент поглощения равен $2,8 \cdot 10^4$. Следует отметить хорошую воспроизводимость результатов, широкий диапазон определяемых содержаний циркония и рН.

Определению не мешают (в соотношениях по массе): Mg, Ca, Ba, Zn (500); Mn(II) (200); Al (100); Sn(II), Bi, La, (50); MoO_4^{2-} , Ni (20); Fe(III) (10); Th (2); Cu (12).

В мерную пробирку емк. 10 мл помещают исследуемый раствор, прибавляют 0,4 мл 0,01 М водно-этанольного (1:1) раствора ЭХЧ, разбавляют до 10 мл 1 М HCl, перемешивают и нагревают на кипящей водяной бане 2 мин для ускорения установления равновесия в системе. Затем раствор охлаждают, прибавляют 1 мл 0,1 М ПДАМ и экстрагируют 5 мл хлороформа 2 мин. Экстракт отделяют и измеряют оптическую плотность по отношению к экстракту контрольного опыта.

Методика внедрена на Ровенской АЭС для определения микроколичеств циркония в теплоносителе I контура реактора. При определении 5,0 мкг Zr методом введено — найдено определяем $5,0 \pm 0,2$ мкг Zr в присутствии добавок 7,0 и 10,0 мкг Zr ($n=5$; $P=0,95$).

Доступность и низкая стоимость ЭХЧ выгодно отличают данную методику от известных.

ВЫВОДЫ

Определены оптимальные условия комплексообразования в системе цирконий — пропилидиантипирилметан — эриохромовый черный Т. Установлено соотношение компонентов в комплексе и его заряд, изучен химизм комплексообразования. На основе полученных данных разработана экстракционно-фотометрическая методика определения циркония.

Список литературы

1. Пилипенко А. Т., Тананайко М. М. Разнолигандные и разнометалльные комплексы и их применение в аналитической химии. М.: Химия, 1983. С. 222.
2. Островская М. С., Штокало М. И., Пятницкий И. В., Рыженко В. Л. // Завод. лаб. 1980. Т. 46. № 2. С. 97.
3. Штокало М. И., Костенко Е. Е. // Журн. аналит. химии. 1984. Т. 39. № 11. С. 2019.
4. Штокало М. И., Перепеченко Е. Е. // Журн. неорганической химии. 1979. Т. 24. № 11. С. 2997.
5. Бабко А. К., Василенко В. Т. // Укр. хим. журн. 1960. Т. 26. № 3. С. 515.
6. Назаренко В. А. // Тр. Комис. по аналит. химии АН СССР. М.: Наука, 1969. Т. 17. С. 22.
7. Соловкин А. С. // Журн. неорганической химии. 1957. Т. 2. № 3. С. 611.

8. Диантипирилметан и его гомологи как аналитические реагенты. Пермь: Уч. зап. ун-та, 1974. № 324. 300 С.
9. Бишон П. Индикаторы. М.: Мир, 1979. Ч. 2. С. 402.

Киевский технологический институт
пищевой промышленности

Поступила в редакцию
23.I.1989

**COMPLEXATION
IN A ZIRCONIUM — PROPYLDIANTIPYRYLMETHANE — ERIOCHROM
BLACK T SYSTEM**

M. I. SHYOKALO, E. E. KOSTENKO

Kiev Technological Institute of Food Industry

Optimal conditions have been found for complex formation in a zirconium — propyldiantipyrylmethane — Eriochrom Black T system. The component ratio in the complex and its charge have been estimated. The complexation chemism has been studied. An extraction-photometric method of determining zirconium has been developed.