**ТИАЗОЛО(3,2-а)ПИРИМИДИНИЕВЫЕ СОЛИ.
СИНТЕЗ ИЗ СОЛЕЙ α -АМИНОТИАЗОЛОВ
И СИММЕТРИЧНЫХ ρ -ДИКЕТОНОВ**

С. И. Шульга, В. А. Чуйгук

Известно два типа производных систем тиазоло(3,2-а) пиримидина: кетопроизводные и ониевые соли. Первые известны давно; их получают конденсацией α -аминотиазолов с производными ρ -кетокислот [1]. Соединения второго типа синтезированы недавно из 2-меркаптопиримидинов и α -галогенкетоннов в две стадии; получено 5 солей этого типа (I) [2].

i

В настоящей работе разработан предложенный ранее способ получения конденсированных пиримидиниевых солей для синтеза тиазолпиримидиниевых солей конденсацией простых солей α -аминотиазолов с ρ -дикетонами. Общая схема реакции следующая:

В работе использовали простые соли (галогенводородные и в особенности перхлораты) α -аминотиазолов, -бензтиазолов, -нафто(2,1-й?) тиазола и -тиазолина-2. В качестве ρ -дикетоннов применяли ацетилацетон, метил- и этилацетилацетоны и дибензоилметан. Синтез происходит

Таблица 1

Тиазоло[3,2-а]пиримидиновые соли

С₁₁ Р - Ц Д Ч ?
К,

Я	Яi		йз	Выход, %	Т. пл., °С	Формула	Б. %	
							вычислено	найде- но
СН ₃	Н	Н	Н	85	218—219	C ₈ H ₉ С1M ₂ O ₄ 8	12,1	12,0
СН ₃	СН ₃	Н	Н	50	149—150	С д Н ц С и Д ^	11,5	11,2
СН ₃	Н	СН ₃	Н	97	218—219	C ₉ H ₁₁ СШ ₂ O ₄ 5	11,5	11,2
СН ₃	СН ₃	СН ₃	Н	39	173—174	C ₁₀ H ₁₃ СМ ₂ O ₄ 5	10,9	10,7
СН ₃	н	С ₆ H ₅	Н	87	267	C ₁₄ H ₁₃ С1Ш ₂ O ₄ 8	9,7	9,6
СН ₃	н	гс-С1С ₆ H ₄	Н	84	207—208	C ₁₄ H ₁₂ С1M ₂ 8	8,0	8,1
СН ₃	Н	га-ВгС ₆ H ₄	Н	85	304	C ₁₄ H ₁₂ ВГСШ ₂ O ₄ 8	7,6	7,7
СН ₃	Н	я-СН ₃ С ₆ H ₄	Н	92	276	C ₁₅ H ₁₅ С1Ы ₂ O ₄ 8	9,0	9,1
СН ₃	Н	п-ОСН ₃ С ₆ H ₄	Н	87	257—258	C ₁₅ H ₁₅ С1Ы ₂ O ₅ 8	8,6	8,8
СН ₃	Н	я-С ₂ H ₅ С ₆ H ₄	Н	83	242—243	C ₁₆ H ₁₇ С1Ы ₂ O ₄ 8	8,7	8,6
С ₆ H ₅	Н	н	н	62	268—270	C ₁₈ H ₁₃ С1Ы ₂ O ₄ 5	8,2	8,4
С ₆ H ₅	Н	СН ₃	Н	35	255—256	C ₁₉ H ₁₅ С1Ы ₂ O ₄ 8	8,0	7,9
С ₆ H ₅	Н	л-СН ₃ С ₆ H ₄	Н	26	270	C ₂₅ H ₁₉ С1M ₂ O ₄ 8	6,7	6,7
С ₆ H ₅	Н	л-ВгС ₆ H ₄	Н	21	310—312	C ₂₄ H ₁₈ ВгС1Г ₂ O ₄ 8	5,9	5,9
СН ₃	Н	СН ₃	СН ₃	65	280—281	C ₁₀ H ₁₃ Ш ₂ 5	10,0	10,1
С ₆ H ₅	Н	я-ОСН ₃ С ₆ H ₄	Н	56	281—282	C ₂₅ H ₁₉ СВД ₂ O ₆ 5	6,5	6,5
СН ₃	Н	—СН ₂ СН ₂ СН ₂ СН ₂ —	Н	92	247—248	C ₁₂ H ₁₅ СШ ₂ O ₄ 8	10,0	10,0

* Иодид.

Таблица 2

Пиримидо[2,1-б]бензтиазолиевые соли

К	Ик		Выход, %	Т. пл., °С	формула	э, %	
						вычислено	найдено
СН ₃	Н	Н	94	238—239	С и Н ц С Ш А Б	10,2	10,5
СН ₃	Н	Вг	95	291	C ₁₂ H ₁₀ ВгС1M ₂ O ₄ 8	8,1	8,0
СН ₃	Н	ОСН ₃	97	281	C ₁₃ H ₁₃ С1Ы ₂ O ₅ 8	9,3	9,0
СН ₃	Н	С1	96	280	C ₁₂ H ₁₀ С1 ₂ Ч ₂ O ₄ 8	9,2	9,4
СН ₃	Н	СН ₃	97	273	C ₁₃ H ₁₃ СМ ₂ O ₄ 8	9,7	9,6
СН ₃	Н	NO ₂	77	282	C ₁₂ H ₁₀ С1Ы ₂ O ₆ 8	8,9	8,9
СН ₃	СН ₃	Н	76	205—206	C ₁₃ H ₁₃ СШ ₂ O ₄ 8	9,8	9,7
СН ₃	СН ₃	ОСН ₃	89	248—249	C ₁₄ H ₁₆ СШ ₂ O ₆ 8	8,9	8,9
СН ₃	С ₂ H ₅	Вг	82	262—263	C ₁₄ H ₁₄ ВГСМ ₂ O ₄ 8	7,6	7,7
С ₆ H ₅	Н	Н	66	260	C ₂₂ H ₁₅ С1Ы ₂ O ₄ 8	7,3	7,2
С ₆ H ₅	Н	Вг	44	285—286	C ₂₂ H ₁₄ ВГС1M ₂ O ₄ 8	6,2	6,2
С ₆ H ₅	Н	ОСН ₃	46	295	C ₂₃ H ₁₇ С1Ы ₂ O ₆ 8	6,8	6,8
СН ₃	С ₂ H ₅	Н	80	243—245	C ₁₄ H ₁₅ СШ ₂ O ₄ 8	9,3	9,1
С ₆ H ₅	Н	СН ₃	33	261—262	C ₂₃ H ₁₇ СШ ₂ O ₄ 8	7,1	7,0

быстро и с хорошими выходами при нагревании компонентов без растворителя или в спиртовом растворе. Продукты реакции — бесцветные кристаллические вещества — дают в обычных условиях полиметиновые красители, за исключением желтых производных дибензоилметана, которые красителей не образуют, так как не содержат активных металлических групп.

Синтезированные новые тиазоло(3,2-а)пиримидиниевые соли представлены в табл. 1—3.

Таблица 3

Пиримидо[2,1-б]нафто (2,1-с) тиазолиевые соли

сю; R R,

R	Ri	Выход, %	Т. пл., °C	Формула	S, %	
					вычислено	найдено
CH ₃	H	97	260	C ₁₆ H ₁₃ CIN ₂ O ₄ S	8,8	8,9
CH ₃	CH ₃	77	266—267	C ₁₇ H ₁₅ CIN ₂ O ₄ S	8,5	8,3
CH ₃	C ₂ H ₅	64	238—240	C ₁₈ H ₁₇ CIN ₂ O ₄ S	8,2	8,1
C ₆ H ₅	H	21	299—300	C ₂₆ H ₁₇ CIN ₂ O ₄ S	6,6	6,6

Смесь 0,02 моля соли соответствующего α-аминотиазола и 0,03 моля β-дикетона нагревали при 135—150° в течение 3—4 час. или кипятили в спиртовом растворе 3—6 час. Затем продукт промывали ацетоном или эфиром и кристаллизовали из метанола. При конденсации в спирте отделяли выпавшие после охлаждения кристаллы; добавочное количество продукта выделяли из фильтрата осаждением эфиром.

Обычно конденсация без растворителя происходит быстрее и с большим выходом. Можно проводить конденсацию при кипячении в спирте смеси соответствующего α-аминотиазола, β-дикетона и кислоты (соляной или хлорной), но выход в этом случае меньше (~40%).

5,7-Диметил-2,3-дигидротиазоло(3,2-а)пиримидиний перхлорат. Смесь 3 г (0,015 моля) перхлората α-аминотиазолина-2, 3 мл (0,030 моля) ацетилацетона и 2 мл этанола кипятили 6 час. После охлаждения высадили эфиром 3 г (71%) желтоватого продукта. Перекристаллизацией из метанола получены бесцветные иглы, т. пл. 237—238°.

Найдено, %: S 12,3. C₉H₁₁CIN⁺S. Вычислено, %: S 12,0.

ЛИТЕРАТУРА

- W. L. Mosby, Heterocyclic Systems with Bridgehead Nitrogen Atoms, N. Y.—London, 1961, стр. 779.
- C. K. Bradsher, D. F. Lohr, J. Heterocyclic Chem., 4, 74 (1967).

Киевский технологический институт
пищевой промышленности
Киевский государственный университет

Поступила
30 октября 1968 г.