

Хвильові розв'язки нелінійного рівняння дифузії

I.I. ЮРИК †, Т.А. БАРАННИК ‡

† Національний університет харчових технологій, Київ
E-mail: aprrmath@imath.kiev.ua

‡ Полтавський держ. пед. університет ім. В.Г. Короленка
E-mail: barannuk_t@poltava.velton.ua

З використанням спеціального анзацу знайдено хвильові розв'язки нелінійного рівняння дифузії.

Wave solutions for a nonlinear diffusion equation are found by using the special ansatz.

Вступ. Робота присвячена побудові точних розв'язків нелінійного рівняння дифузії

$$u_t = u_{xx} + \lambda u^{\frac{n-1}{2}} u_x + a_0 u^n + a_1 u + a_2 u^{\frac{n+1}{2}} + a_3 u^{\frac{3-n}{2}} + a_4 u^{2-n}, \quad (1)$$

де $u = u(t, x)$, $u_t = \frac{\partial u}{\partial t}$, $u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $u_x = \frac{\partial u}{\partial x}$, $\lambda \geq 0$, $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$, $n \neq 1$. Якщо $a_0 \neq 0$, то a_0 можна звести до 1 або -1 , помноживши функцію u на відповідний скаляр. Рівняння (1) є узагальненням класичного рівняння Бюргерса $u_t = u_{xx} + \mu u u_x$, а також відомих рівнянь Фішера [1] $u_t = u_{xx} = u(1-u)$ і Маррі [2] $u_t = u_{xx} + \lambda u u_x + \varepsilon u^2 + cu$. Важливим частинним випадком рівняння (1) є рівняння типу Колмогорова–Петровського–Піскунова

$$u_t = u_{xx} + a_0 u^n + a_1 u + a_2 u^{\frac{n+1}{2}} + a_3 u^{\frac{3-n}{2}} + a_4 u^{2-n}, \quad (2)$$

яке досліджувалося в [3]. Відзначимо, що систематичне вивчення умовної симетрії цього рівняння для $n = 3$, $a_4 = 0$ було започатковано в [4].

Для побудови точних розв'язків рівняння (1) ми використовуємо анзац

$$u = k \left(\frac{z_x}{z} \right)^{\frac{2}{n-1}}, \quad (3)$$

де k – стала, $z = z(t, x)$, запропонований в [3] для побудови точних розв'язків рівняння (2).

В залежності від значення коефіцієнта a_0 виділимо два випадки.

Випадок $a_0 \neq 0$. Підставимо (3) в (1):

$$\begin{aligned} & \frac{2k}{n-1} z_x^{\frac{3-n}{n-1}} z_{xt} z^{-\frac{2}{n-1}} - \frac{2k}{n-1} z_x^{\frac{2}{n-1}} z_t z^{-\frac{n+1}{n-1}} = \\ & = \frac{2k(3-n)}{(n-1)^2} z_x^{\frac{4-2n}{n-1}} z_{xx}^2 z^{-\frac{2}{n-1}} + \frac{2k}{n-1} z_x^{\frac{3-n}{n-1}} z_{xxx} z^{-\frac{2}{n-1}} - \\ & - \frac{4k}{(n-1)^2} z_x^{\frac{2}{n-1}} z_{xx} z^{-\frac{n+1}{n-1}} - \frac{2k(n+1)}{(n-1)^2} z_x^{\frac{2}{n-1}} z_{xx} z^{-\frac{n+1}{n-1}} + \\ & + \frac{2k(n+1)}{(n-1)^2} z_x^{\frac{2n}{n-1}} z^{-\frac{2n}{n-1}} + \lambda k^{\frac{n-1}{2}} z_x z^{-1} \times \\ & \times \left(\frac{2k}{n-1} z_x^{\frac{3-n}{n-1}} z_{xx} z^{-\frac{2}{n-1}} - \frac{2k}{n-1} z_x^{\frac{2}{n-1}} z_x z^{-\frac{n+1}{n-1}} \right) + \\ & + a_0 k^n \left(\frac{z_x}{z} \right)^{\frac{2n}{n-1}} + a_1 k \left(\frac{z_x}{z} \right)^{\frac{2}{n-1}} + a_2 k^{\frac{n+1}{2}} \left(\frac{z_x}{z} \right)^{\frac{n+1}{n-1}} + \\ & + a_3 k^{\frac{3-n}{2}} \left(\frac{z_x}{z} \right)^{\frac{3-n}{n-1}} + a_4 k^{2-n} \left(\frac{z_x}{z} \right)^{\frac{4-2n}{n-1}}. \end{aligned} \quad (4)$$

Будемо вважати, що в рівнянні (4)

$$a_0 k^{n-1} - \frac{2\lambda}{n-1} k^{\frac{n-1}{2}} + \frac{2(n+1)}{(n-1)^2} = 0. \quad (5)$$

Рівняння (5) є квадратним відносно $k^{\frac{n-1}{2}}$ і має корені

$$k^{\frac{n-1}{2}} = \frac{\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 2(n+1)a_0}}{a_0(n-1)}. \quad (6)$$

Помноживши обидві частини рівняння (4) на $z_x^{\frac{2n-4}{n-1}} z^{\frac{n+1}{n-1}}$, отримаємо

$$\begin{aligned} & z \left[\frac{2}{n-1} z_x z_{xt} - \frac{2}{n-1} z_x z_{xxx} - a_3 k^{\frac{1-n}{2}} z z_x - a_4 k^{1-n} z^2 - \right. \\ & \left. - \frac{2(3-n)}{(n-1)^2} z_{xx}^2 \right] = z_x^2 \left[\frac{2}{n-1} z_t + a_1 z + a_2 k^{\frac{n-1}{2}} z_x - \right. \\ & \left. - \frac{2(n+3)}{(n-1)^2} z_{xx} + \frac{2\lambda k^{\frac{n-1}{2}}}{n-1} z_{xx} \right]. \end{aligned}$$

Використовуючи позначення

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{2\lambda_1}{n-1}, & a_2 &= \frac{2\lambda_2}{n-1}k^{\frac{1-n}{2}}, & a_3 &= \frac{2\lambda_3}{n-1}k^{\frac{1-n}{2}}, \\ a_4 &= \frac{2\lambda_4}{n-1}k^{1-n}, & \tilde{\lambda} &= \lambda k^{\frac{n-1}{2}}, \end{aligned} \quad (7)$$

попереднє рівняння можна переписати в такому вигляді:

$$\begin{aligned} z \left[z_x z_{xt} - z_x z_{xxx} - \lambda_3 z z_x - \lambda_4 z^2 + \frac{n-3}{n-1} z_{xx}^2 \right] = \\ = z_x^2 \left[z_t + \lambda_1 z + \lambda_2 z_x - \frac{n+3}{n-1} z_{xx} + \tilde{\lambda} z_{xx} \right]. \end{aligned} \quad (8)$$

Розв'язок рівняння (8) шукаємо у вигляді

$$z = \phi(\xi), \quad \xi = x + \mu t. \quad (9)$$

Підставивши (9) в (8), отримуємо рівняння

$$\begin{aligned} \phi \left[\mu \phi' \phi'' - \phi' \phi''' - \lambda_3 \phi \phi' - \lambda_4 \phi^2 + \frac{n-3}{n-1} (\phi'')^2 \right] = \\ = (\phi')^2 \left[\mu \phi' + \lambda_1 \phi + \lambda_2 \phi' - \frac{n+3}{n-1} \phi'' + \tilde{\lambda} \phi'' \right], \end{aligned} \quad (10)$$

де $\phi' = \frac{d\phi}{d\xi}$.

Розв'язки рівняння (10) шукаємо у вигляді [5]

$$\phi = \nu_0 + \nu_1 \varphi + \nu_2 \varphi^2 + \dots, \quad (11)$$

де ν_0, ν_1, \dots - сталі, а функція φ задовольняє рівняння

$$\varphi' = \varepsilon \sqrt{C_0 + C_1 \varphi + C_2 \varphi^2 + \dots}, \quad \varepsilon = \pm 1. \quad (12)$$

Для того, щоб функція (11) була розв'язком рівняння (10), ми повинні прирівняти окремо всі доданки, які містять парні і непарні степені квадратного кореня, визначеного формулою (12). Враховуючи це зауваження, отримуємо таку систему рівнянь:

$$\begin{aligned} \mu \phi \phi' \phi'' - \lambda_3 \phi^2 \phi' &= (\lambda_2 + \mu)(\phi')^3, \\ \phi \left(\phi' \phi''' + \lambda_4 \phi^2 + \frac{3-n}{n-1} (\phi'')^2 \right) &= \end{aligned} \quad (13)$$

$$= (\phi')^2 \left(\frac{n+3}{n-1} \phi'' - \bar{\lambda} \phi'' - \lambda_1 \phi \right). \quad (14)$$

Поділимо обидві частини рівняння (13) на $\mu \phi^2 \phi'$:

$$\frac{\phi''}{\phi} - \frac{\lambda_3}{\mu} = \left(\frac{\lambda_2}{\mu} + 1 \right) \frac{(\phi')^2}{\phi^2}.$$

Виконаємо заміну

$$Y = \frac{\phi'}{\phi}, \quad \frac{\phi''}{\phi} = Y' + Y^2,$$

яка перетворює рівняння (13) в рівняння Ріккати

$$Y' - \frac{\lambda_2}{\mu} Y^2 = \frac{\lambda_3}{\mu}. \quad (15)$$

Загальний розв'язок рівняння (15) утворюють функції

$$Y = \sqrt{\frac{-\lambda_3}{\lambda_2}} \tanh \left(\frac{\sqrt{-\lambda_2 \lambda_3}}{\mu} \xi + C \right),$$

$$Y = \sqrt{\frac{-\lambda_3}{\lambda_2}} \left(\tanh \left(\frac{\sqrt{-\lambda_2 \lambda_3}}{\mu} \xi + C \right) \right)^{-1}, \quad \text{якщо } \lambda_2 \lambda_3 < 0, \quad (16)$$

$$Y = \sqrt{\frac{\lambda_3}{\lambda_2}} \tan \left(\frac{\sqrt{\lambda_2 \lambda_3}}{\mu} \xi + C \right), \quad \text{якщо } \lambda_2 \lambda_3 > 0, \quad (17)$$

$$Y = -\frac{\mu}{\lambda_2(\xi + C)}, \quad \text{якщо } \lambda_3 = 0, \quad (18)$$

де C – стала інтегрування.

Поділимо обидві частини рівняння (14) на ϕ^3 :

$$\frac{\phi'''}{\phi} \frac{\phi'}{\phi} + \lambda_4 + \frac{3-n}{n-1} \frac{(\phi'')^2}{\phi^2} = \frac{(\phi')^2}{\phi^2} \left(\frac{n+3}{n-1} \frac{\phi''}{\phi} - \bar{\lambda} \frac{\phi''}{\phi} - \lambda_1 \right).$$

Заміна

$$Y = \frac{\phi'}{\phi}, \quad \frac{\phi''}{\phi} = Y' + Y^2, \quad \frac{\phi'''}{\phi} = Y'' + 3Y Y' + Y^3,$$

перетворює рівняння (14) в рівняння

$$Y Y'' - \frac{n+1}{n-1} Y^4 + \lambda_4 + \frac{3-n}{n-1} (Y')^2 +$$

$$+\tilde{\lambda}Y'Y^2 + \tilde{\lambda}Y^4 + \lambda_1Y^2 = 0. \quad (19)$$

З'ясуємо, наприклад, при яких значеннях параметрів λ_1 , λ_2 , λ_3 , λ_4 і μ функція (16) буде задовольняти рівняння (19). Підставивши (16) в (19) і прирівнявши коефіцієнти при відповідних степенях $\text{ch}\left(\frac{\sqrt{-\lambda_2\lambda_3}}{\mu}\xi + C\right)$, отримаємо систему рівнянь

$$\begin{aligned} 2\frac{\lambda_3^2}{\mu^2} - \frac{n+1}{n-1}\left(\frac{\lambda_3}{\lambda_2}\right)^2 + \frac{3-n\lambda_3^2}{n-1\mu^2} - \\ - \tilde{\lambda}\left(-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{(-\lambda_2\lambda_3)^{\frac{1}{2}}}{\mu} + \tilde{\lambda}\left(-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}\right)^2 = 0, \end{aligned} \quad (20)$$

$$\begin{aligned} -2\frac{\lambda_3^2}{\mu^2} + 2\frac{n+1}{n-1}\left(-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}\right)^2 + \tilde{\lambda}\left(-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{(-\lambda_2\lambda_3)^{\frac{1}{2}}}{\mu} - \\ - 2\tilde{\lambda}\left(-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}\right) + \frac{\lambda_1\lambda_3}{\lambda_2} = 0, \end{aligned} \quad (21)$$

$$-\frac{n+1}{n-1}\left(\frac{\lambda_3}{\lambda_2}\right)^2 + \lambda_4 + \tilde{\lambda}\left(-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}\right)^2 - \lambda_1\left(\frac{\lambda_3}{\lambda_2}\right) = 0. \quad (22)$$

З рівняння (20) випливає, що

$$\mu = \pm\lambda_2, \quad \text{якщо } \tilde{\lambda} = 0, \quad \mu = |\lambda_2|, \quad \text{якщо } \tilde{\lambda} \neq 0.$$

З рівняння (21) знаходимо, що

$$\lambda_1 = \left(-\frac{4}{n-1} + \tilde{\lambda}\right)\frac{\lambda_3}{\lambda_2}. \quad (23)$$

Підставивши в рівняння (22), отримуємо

$$\lambda_4 = \frac{n-3}{n-1}\left(\frac{\lambda_3}{\lambda_2}\right)^2. \quad (24)$$

Отже, рівняння (1) має розв'язок

$$u = k \left(\sqrt{-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}}\right)^{\frac{2}{n-1}} \left[\tanh\left(\sqrt{-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}}(x + |\lambda_2|t) + C\right)\right]^{\frac{2}{n-1}},$$

де k визначається формулою (6), а коефіцієнти a_1 , a_2 , a_3 , a_4 рівняння (1) визначаються співвідношеннями (7), (23), (24). Відзначимо, що розв'язки рівняння (1) для $\lambda = 0$ наведені в [3].

Аналогічно показуємо, що розв'язками рівняння (1) є функції

$$u = k \left(\sqrt{-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}} \right)^{\frac{2}{n-1}} \left[\tanh \left(\sqrt{-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}} (x + |\lambda_2|t) + C \right) \right]^{-\frac{2}{n-1}},$$

якщо $\lambda_2\lambda_3 < 0$;

$$u = k \left(\sqrt{\frac{\lambda_3}{\lambda_2}} \right)^{\frac{1}{n-1}} \left[\tan \left(\sqrt{\frac{\lambda_3}{\lambda_2}} (x + |\lambda_2|t) + C \right) \right]^{\frac{2}{n-1}},$$

якщо $\lambda_2\lambda_3 > 0$.

Випадок $a_0 = 0$. Рівняння (1) набуває вигляду

$$u_t = u_{xx} + \lambda u^{\frac{n-1}{2}} u_x + a_1 u + a_2 u^{\frac{n+1}{2}} + a_3 u^{\frac{3-n}{2}} + a_4 u^{2-n}. \quad (25)$$

Будемо вважати, що в рівнянні (25) $\lambda \neq 0$. З рівняння (5) знаходимо, що

$$k^{\frac{n-1}{2}} = \frac{n+1}{\lambda(n-1)}.$$

Отже, розв'язками рівняння (25) є функції

$$u = \left(\frac{n+1}{\lambda(n-1)} \sqrt{-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}} \right)^{\frac{2}{n-1}} \left[\tanh \left(\sqrt{-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}} (x + |\lambda_2|t) + C \right) \right]^{\frac{2}{n-1}},$$

$$u = \left(\frac{n+1}{\lambda(n-1)} \sqrt{-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}} \right)^{\frac{2}{n-1}} \left[\tanh \left(\sqrt{-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}} (x + |\lambda_2|t) + C \right) \right]^{-\frac{2}{n-1}},$$

$$u = \left(\frac{n+1}{\lambda(n-1)} \sqrt{-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}} \right)^{\frac{2}{n-1}} \left[\tan \left(\sqrt{-\frac{\lambda_3}{\lambda_2}} (x + |\lambda_2|t) + C \right) \right]^{\frac{2}{n-1}}.$$

- [1] Fisher R.A. The wave of advance of advantageous genes // Ann. Eugenics. - 1937. - 7. - P. 353-369.
- [2] Murray J.D. Mathematical biology. - Berlin: Springer, 1989. - 750 p.
- [3] Nikitin A.G., Barannyk T.A. Solitary wave and other solutions for nonlinear heat equations // Centr. Eur. J. Math. - 2005. - 2. - P. 840-858.
- [4] Фушчич В.И., Серов Н.И. Условная инвариантность и редукция нелинейного уравнения теплопроводности // Докл. АН УССР. - 1990. - № 7. - С. 24-28.
- [5] Fan E. Multiple travelling wave solutions of nonlinear evolution equations using a unified algebraic method // J. Phys. A: Math. Gen. - 2002. - 35. - P. 6853-6872.