

Реалізація методу Жордана - Гауса з допомогою Ms Excel

Розв'язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь є одним із основних розділів як шкільної математики, так і багатьох курсів вузівських програм. Для розв'язування таких систем використовуються відомі в математиці методи - матричний, Крамера, Гауса, Жордана – Гауса. Найбільш зручним серед них є метод Жордана – Гауса, він дає змогу досліджувати на сумісність довільні системи алгебраїчних рівнянь та розв'язувати їх, знаходити ранг матриці, обернену матрицю [1-4], реалізовувати симплекс-метод та його модифікації при розв'язуванні екстремальних задач економічного змісту [5] тощо. При розв'язуванні довільних систем лінійних алгебраїчних рівнянь за методом Жордана - Гауса потрібно послідовно зробити кілька кроків перетворення за певним правилом переходу від однієї розрахункової таблиці до іншої. Сутність цього методу полягає у покроковому виключенні невідомих із системи рівнянь. Оскільки кроки переходу є алгоритмічними процедурами, то метод Жордана – Гауса є простим у застосуванні та легко реалізується з допомогою Ms Excel.

В даній статті розкриємо сутність застосування електронних таблиць Ms Excel для розв'язання деяких задач з курсів вищої математики, математичного програмування та визначимо переваги реалізації даного методу над традиційними.

Розглянемо традиційний алгоритм кроку перетворення методу Жордана - Гауса [1-3]. Нехай задано систему лінійних алгебраїчних рівнянь

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1l}x_l + \dots + a_{1j}x_j + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2l}x_l + \dots + a_{2j}x_j + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kl}x_l + \dots + a_{kj}x_j + \dots + a_{kn}x_n = b_k, \\ \dots\dots\dots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{il}x_l + \dots + a_{ij}x_j + \dots + a_{in}x_n = b_i, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{ml}x_l + \dots + a_{mj}x_j + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{array} \right.$$

Складаємо відповідну системі розрахункову таблицю.


Базис	X ₁	X ₂	...	X _l	...	X _j	...	X _n	b _i	K
	a ₁₁	a ₁₂	...	a _{1l}	...	a _{1j}	...	a _{1n}	b ₁	
	a ₂₁	a ₂₂	...	a _{2l}	...	a _{2j}	...	a _{2n}	b ₂	
	
	a _{k1}	a _{k2}	...	a _{kl}	...	a _{kj}	...	a _{kn}	b _k	
	
	a _{i1}	a _{i2}		a _{il}	...	a _{ij}	...	a _{in}	b _i	
	
	a _{m1}	a _{m2}		a _{ml}	...	a _{mj}	...	a _{mn}	b _m	

Алгоритм переходу до наступної таблиці:

1. Обираємо розв'язувальний елемент $a_{ij} \neq 0$ (найкраще вибирати 1, якщо такий елемент є в таблиці);
2. Елементи i -го рядка (розв'язувального рядка) ділимо на a_{ij} і результат записуємо в i -ий рядок нової таблиці;
3. В розв'язувальному j -му стовпці нової таблиці замість a_{ij} пишемо одиницю, а замість інших елементів цього стовпця пишемо нулі;
4. Усі інші елементи наступної розрахункової таблиці, обчислюють за формулою:

$$a_{kl}^{(1)} = \frac{a_{ij} \cdot a_{kl} - a_{il} \cdot a_{kj}}{a_{ij}}, \quad k = 1, 2, \dots, m; l = 1, 2, \dots, n; k \neq i, j \neq l. \quad (1)$$

Обчислення елементів нової таблиці за формулою (1) доцільно виконувати з використанням схеми прямокутника



5. Правильність підрахунків перевіряють порівнянням елементів контрольного стовпця із сумою елементів відповідного рядка.

Розглянемо приклади в яких використовується метод Жордана – Гауса та реалізація його в Ms Excel.

I. Застосування методу Жордана - Гауса для розв’язування систем лінійних рівнянь.

Приклад 1. Розв’язати систему лінійних рівнянь за методом Жордана - Гауса

$$\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - 5x_3 = 2 \end{cases}$$

Розв’язування. Складемо початкову таблицю із коефіцієнтів системи

	X1	X2	X3	Ві	К
	2	-4	3	1	2
	1	-2	4	3	6
	3	-1	-5	2	-1

Нехай розв’язувальним елементом буде $a_{21}=1$, тоді в новій таблиці $a_{21}^{(1)}=1$, а всі інші елементи першого (розв’язувального) стовпця рівні 0. В базис піде X_1 в другий рядок. Елементи розв’язувального рядка ділимо на a_{21} та записуємо в другий рядок нової таблиці. Всі інші елементи нової таблиці обчислимо користуючись формулою (1) та правилом прямокутника.

$$a_{12}^{(1)} = \frac{1 \cdot (-4) - 2 \cdot (-2)}{1} = 0, a_{13}^{(1)} = \frac{1 \cdot 3 - 4 \cdot 2}{1} = -5, b_1^{(1)} = \frac{1 \cdot 1 - 2 \cdot 3}{1} = -5, k_1^{(1)} = \frac{1 \cdot 2 - 6 \cdot 2}{1} = -10,$$

$$a_{32}^{(1)} = \frac{1 \cdot (-1) - 3 \cdot (-2)}{1} = 5, a_{33}^{(1)} = \frac{1 \cdot (-5) - 4 \cdot 3}{1} = -17, b_3^{(1)} = \frac{1 \cdot 2 - 3 \cdot 3}{1} = -7, k_3^{(1)} = \frac{1 \cdot (-1) - 6 \cdot 3}{1} = -19.$$

Отримаємо таблицю

	X1	X2	X3	Ві	К
	0	0	-5	-5	-10
X1	1	-2	4	3	6

	0	5	-17	-7	-19
--	---	---	-----	----	-----

або розділивши перший рядок на (-5) маємо

	X1	X2	X3	Ві	К
	0	0	1	1	2
X1	1	-2	4	3	6
	0	5	-17	-7	-19

Правильність обчислень при переході підтверджують рівність суми елементів відповідних рядків відповідним елементам контрольного стовпця.

Виберемо, в останній таблиці, за розв'язувальний елемент $a_{13}^{(1)} = 1$ (розв'язувальний стовпець 3), тому в новій таблиці $a_{13}^{(2)} = 1$, а всі інші елементи розв'язувального стовпця рівні 0. Перший стовпець в нову таблицю також переносимо без змін, тому що він відповідає базисному елементу X_1 . Всі інші елементи нової таблиці знаходимо користуючись (1).

$$a_{22}^{(2)} = \frac{1 \cdot (-2) - 0 \cdot 4}{1} = -2, b_2^{(2)} = \frac{1 \cdot 3 - 4 \cdot 1}{1} = -1, k_2^{(2)} = \frac{1 \cdot 6 - 4 \cdot 2}{1} = -2,$$

$$a_{32}^{(2)} = \frac{1 \cdot 5 - 0 \cdot (-17)}{1} = 5, b_3^{(2)} = \frac{1 \cdot (-7) - 1 \cdot (-17)}{1} = 10, k_3^{(2)} = \frac{1 \cdot (-19) - (-17) \cdot 2}{1} = 15.$$

Отримаємо наступну таблицю

	X1	X2	X3	Ві	К
X3	0	0	1	1	2
X1	1	-2	0	-1	-2
	0	5	0	10	15

або розділивши третю строчку на 5 отримаємо

	X1	X2	X3	Ві	К
X3	0	0	1	1	2
X1	1	-2	0	-1	-2
	0	1	0	2	3

Знаходимо суму отриманих елементів кожного рядка останньої таблиці та пересвідчимося в правильності переходу.

Виберемо розв'язувальний елемент $a_{22}^{(2)} = 1$ та ввівши в базис третьої строчки X_2 виконаємо перехід до нової таблиці користуючись кроками 1)-4).

Отримаємо

	X1	X2	X3	Bi	K
X3	0	0	1	1	2
X1	1	0	0	3	4
X2	0	1	0	2	3

Отже, з останньої таблиці розв'язком системи є $X_1=3$, $X_2=2$, $X_3=1$.

Розв'яжемо розглянутий приклад користуючись електронними таблицями Ms Excel. Для цього складемо початкову розрахункову таблицю в якій не потрібен стовпець для контролю.

	A	B	C	D	E
1	Базис	X1	X2	X3	Bi
2		2	-4	3	1
3		1	-2	4	3
4		3	-1	-5	2

Виберемо розв'язувальний елемент $a_{21}=1$ (в базис піде X_1) та задамо формули переходу для елементів першого стовпця нової таблиці. При формуванні формул переходу обов'язково фіксуємо елементи розв'язувального стовпця (клавіша F4) . $B5=(B3*B2-B52*B3)/B53$; $B6=B3/B53$; $B7=(B3*B4-B54*B3)/B53$ (В першій та третій формулах не обов'язково ділити на розв'язувальний елемент оскільки він дорівнює 1). Отримаємо $a_{11}^{(1)}=0, a_{21}^{(1)}=1, a_{31}^{(1)}=0$. Виділимо отримані результати та розповсюдимо задані формули на всі клітини нової таблиці. Якщо в стовпці, де знаходилася базисна змінна, отримано одиничний базисний вектор, то перехід виконано правильно.

5		0	0	-5	-5
6	X1	1	-2	4	3
7		0	5	-17	-7

Виберемо розв'язувальний елемент $a_{13}^{(1)}=-5$ (в базис піде X_3) та аналогічно задаємо формули переходу для елементів першого стовпця нової таблиці. $B8=B5/D55$; $B9=(D55*B6-D56*B5/D55)$; $B10=(D55*B7-D57*B5)/D55$. Отримані формули розповсюдимо на всі клітини. Перехід виконано правильно, оскільки в стовпці D стоїть одиничний вектор.

	A	B	C	D	E
--	---	---	---	---	---

8	X3	0	0	1	1
9	X1	1	-2	0	-1
10		0	5	0	10

Розв'язувальним буде елемент $a_{32}^{(2)} = 5$, тому в базис піде X_2 . Формули для елементів першого стовпця останньої таблиці $B_{11} = (\$C\$10 * B8 - \$C\$8 * B10) / \$C\10 ; $B_{12} = (\$C\$10 * B9 - \$C\$9 * B10) / \$C\10 , $B_{13} = B10 / \$C\10 . Завершуємо процес розповсюдженням на всі клітини нової таблиці. Оскільки отримано всі базисні вектори, то в стовпці B_i ми маємо розв'язки системи.

	A	B	C	D	E
11	X3	0	0	1	1
12	X1	1	0	0	3
13	X2	0	1	0	2

Відповідь. $X_1=3, X_2=2, X_3=1$.

II. Дослідження на сумісність та розв'язування СЛР.

Приклад 2. Дослідити систему на сумісність за теоремою Кронекера-Капеллі та знайти розв'язок (якщо система сумісна):

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2 \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 2 \end{cases}$$

Розв'язання. Знайдемо ранги звичайної A та розширеної \bar{A} матриць

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -6 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 3 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

З останнього перетворення випливає, що $\text{rang}(A)=3$, а $\text{rang}(\bar{A})=4$. Оскільки $\text{rang}(A) \neq \text{rang}(\bar{A})$ то система несумісна.

Зауваження 1. Такий само результат можна отримати користуючись методом Жордана – Гауса з використанням Ms Excel.

Складемо спочатку відповідну заданій системі таблицю в Ms Excel.

	A	B	C	D	E	F	G
1	БАЗИС	X1	X2	X3	X4		
2		1	1	3	-2	3	1
3		2	2	4	-1	3	2
4		3	3	5	-2	3	1
5		2	2	8	-3	9	2
6	X2	1	1	3	-2	3	1
7		0	0	-2	3	-3	0
8		0	0	-4	4	-6	-2
9		0	0	2	1	3	0

Виберемо розв'язувальний елемент (найкраще вибирати 1). Нехай це буде елемент $a_{12} = 1$ (C2=1) тому в базис піде X₂. Задамо формули переходу для елементів першого стовпця нової таблиці для усного підрахунку

$$a_{11}^{(1)} = \frac{a_{11}}{a_{12}}, a_{21}^{(1)} = \frac{a_{12} \cdot a_{21} - a_{22} \cdot a_{11}}{a_{12}}, a_{31}^{(1)} = \frac{a_{12} \cdot a_{31} - a_{23} \cdot a_{11}}{a_{12}}, a_{41}^{(1)} = \frac{a_{12} \cdot a_{41} - a_{24} \cdot a_{11}}{a_{12}}$$

та з допомогою Ms Excel таким чином, щоб можна їх розповсюдити на всі клітини (фіксуємо елементи розв'язувального стовпця). B6=B2/\$C\$2, B7=(B3*\$C\$2-\$C\$3*B2)/\$C\$2, B8=(B4*\$C\$2-\$C\$4*B2)/\$C\$2, B9=(B5*\$C\$2-\$C\$5*B2)/\$C\$2. Виділимо отримані елементи першого стовпця нової таблиці та розповсюдимо задані в них формули на всі клітини.

В отриманій таблиці вибираємо розв'язувальний елемент $a_{44}^{(1)} = 1$ (E9=1) тому в базис піде X₄. Задамо формули (тільки в Ms Excel) та виконаємо перехід до нової таблиці. B10=(E\$9*B6-E\$6*B9)/E\$9, B11=(E\$9*B7-E\$7*B9)/E\$9, B12=(E\$9*B8-E\$8*B9)/E\$9, B13=B9/E\$9.

Виділимо отримані формули першого стовпця та розповсюдивши їх на всі комірки завершимо перехід до нової таблиці.

	A	B	C	D	E	F	G
10	X2	1	1	7	0	9	1
11		0	0	-8	0	-12	0
12		0	0	-12	0	-18	-2
13	X4	0	0	2	1	3	0

В отриманій таблиці вибираємо розв'язувальний елемент $a_{33}^{(2)} = -12$

(D12=-12) тому в базис піде X_3 . Задамо формули та виконаємо перехід до нової таблиці. $B14=(D12*B10-D14*B12)/D12$, $B15=(D12*B11-D11*B12)/D12$, $B16=B12/D12$, $B17=(D12*B13-D13*B12)/D12$.

	A	B	C	D	E	F	G
14	X2	1	1	0	0	-1,5	- 1/6
15		0	0	0	0	0	1 1/3
16	X3	0	0	1	0	1,5	1/6
17	X4	0	0	0	1	0	- 1/3

Оскільки в останній таблиці з другого рівняння (друга строчка) слідує, що $0=4/3$, то система не має розв'язків.

Зауваження 2. В наступних прикладах окремо проводити дослідження на сумісність не будемо, так як відповідь на це запитання дає покрокова реалізація методу Жордана - Гауса.

Приклад 3. Розв'язати систему лінійних рівнянь за методом Жордана - Гауса.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 2 \\ 6x_1 - x_2 + 2x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 3 \\ 6x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 8x_4 + 13x_5 = 9 \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 = 1 \end{cases}$$

Розв'язання. Оскільки ми маємо в системі чотири рівняння, то базис даного простору складатиметься із чотирьох лінійно-незалежних векторів. Тому розв'язків може бути не більше ніж $C_5^4 = C_5^1 = 5$. Побудуємо початкову таблицю та за методом Жордана - Гауса отримаємо всі загальні розв'язки.

	A	B	C	D	E	F	G
1	БАЗИС	X1	X2	X3	X4	X5	Bi
2		2	-1	1	2	3	2
3		6	-1	2	4	5	3
4		6	-3	4	8	13	9
5		4	-2	1	1	2	1
6	X3	2	-1	1	2	3	2
7		2	1	0	0	-1	-1
8		-2	1	0	0	1	1
9		2	-1	0	-1	-1	-1
10	X3	4	0	1	2	2	1
11	X2	2	1	0	0	-1	-1

12		-4	0	0	0	2	2
13		4	0	0	-1	-2	-2
14	X3	12	0	1	0	-2	-3
15	X2	2	1	0	0	-1	-1
16		-4	0	0	0	2	2
17	X4	-4	0	0	1	2	2
18	X3	8	0	1	0	0	-1
19	X2	0	1	0	0	0	0
20	X5	-2	0	0	0	1	1
21	X4	0	0	0	1	0	0

З останньої таблиці перший загальний розв'язок

$$\begin{cases} x_3 = -1 - 8x_1, \\ x_2 = 0, \\ x_5 = 1 + 2x_1, \\ x_4 = 0, x_1 \in R, \end{cases}$$

Виберемо розв'язувальний елемент B20=-2 і введемо в базис X_1 замість X_5 .

Отримаємо

	A	B	C	D	E	F	G
22	X3	0	0	1	0	4	3
23	X2	0	1	0	0	0	0
24	X1	1	0	0	0	-0,5	-0,5
25	X4	0	0	0	1	0	0

З отриманої таблиці другий загальний розв'язок

$$\begin{cases} x_3 = 3 - 4x_5, \\ x_2 = 0, \\ x_1 = -0,5 + 0,5x_5, \\ x_4 = 0, x_5 \in R, \end{cases}$$

Вибираючи за розв'язувальний F22=4, отримаємо третій загальний розв'язок.

	A	B	C	D	E	F	G
26	X5	0	0	0,25	0	1	0,75
27	X2	0	1	0	0	0	0
28	X1	1	0	0,125	0	0	-0,125
29	X4	0	0	0	1	0	0

$$\begin{cases} x_5 = 0,75 - 4x_3, \\ x_2 = 0, \\ x_1 = -0,125 - 0,125x_3, \\ x_4 = 0, x_3 \in R. \end{cases}$$

Інших розв'язків система не має.

III. Знаходження оберненої матриці.

Для знаходження оберненої матриці скористаємося теоремою [4, с.91].

Теорема. Якщо до одиничної матриці n -го порядку застосувати ті ж елементарні перетворення тільки над рядками і в тому ж порядку з допомогою яких не вироджена квадратна матриця A порядку n зводиться до одиничної, то отримана при цьому матриця буде оберненою до матриці A .

При проведенні перетворень із рядками матриці A і E записують поруч відділяючи їх вертикальною рисою. Тобто

$$(A | E) \rightarrow (E | A^{-1}) \quad (2)$$

Цей метод називають методом Жордана.

Зауваження 3. Попередня теорема правильна, якщо перетворення проводити над стовпцями, але матриці A і E мають бути розташовані в стовпець. Тобто $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}$

Приклад 4. Знайти обернену матрицю до матриці A .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Розв'язання. Обчислимо визначник матриці (функція МОПРЕД)

$$\text{Det}(A) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0, \text{ отже обернена матриця існує.}$$

Знайдемо її користуючись методом Жордана.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			A			E		
2	2	1	0	0	1	0	0	0
3	3	2	0	0	0	1	0	0
4	1	1	3	4	0	0	1	0
5	2	-1	2	3	0	0	0	1
6								
7	1	0,5	0	0	0,5	0	0	0
8	0	0,5	0	0	-1,5	1	0	0
9	0	0,5	3	4	-0,5	0	1	0

10	0	-2	2	3	-1	0	0	1
11								
12	1	0	0	0	2	-1	0	0
13	0	1	0	0	-3	2	0	0
14	0	0	3	4	1	-1	1	0
15	0	0	2	3	-7	4	0	1
16								
17	1	0	0	0	2	-1	0	0
18	0	1	0	0	-3	2	0	0
19	0	0	1	1 1/3	1/3	- 1/3	1/3	0
20	0	0	0	1/3	-7 2/3	4 2/3	- 2/3	1
21								
22	1	0	0	0	2	-1	0	0
23	0	1	0	0	-3	2	0	0
24	0	0	1	0	31	-19	3	-4
25	0	0	0	1	-23	14	-2	3
			E			A^{-1}		

Випишемо кроки переходу від однієї таблиці до іншої.

- 1) Розв'язувальний елемент $A_2=2$. $A_7=A_2/A_2$, $A_8=(A_2*A_3-A_3*A_2)/A_2$, $A_9=(A_2*A_4-A_4*A_2)/A_2$, $A_{10}=(A_2*A_5-A_5*A_2)/A_2$;
- 2) Розв'язувальний елемент $B_8=0,5$. $A_{12}=(B_8*A_7-B_7*A_8)/B_8$, $A_{13}=A_8/B_8$, $A_{14}=(B_8*A_9-B_9*A_8)/B_8$, $A_{15}=(B_8*A_{10}-B_{10}*A_8)/B_8$;
- 3) Розв'язувальний елемент $C_{14}=3$. $A_{17}=(C_{14}*A_{12}-C_{12}*A_{14})/C_{14}$, $A_{18}=(C_{14}*A_{13}-C_{13}*A_{14})/C_{14}$, $A_{19}=A_{14}/C_{14}$, $A_{20}=(C_{14}*A_{15}-C_{15}*A_{14})/C_{14}$.
- 4) Розв'язувальний елемент $D_{20}=1/3$. $A_{22}=(D_{20}*A_{17}-D_{17}*A_{20})/D_{20}$, $A_{23}=(D_{20}*A_{18}-D_{18}*A_{20})/D_{20}$, $A_{24}=(D_{20}*A_{19}-D_{19}*A_{20})/D_{20}$, $A_{25}=A_{20}/D_{20}$.

Отже виконавши чотири кроки жорданових виключень отримали зліва одиничну матрицю E, а праворуч - обернену A^{-1}

$$\text{Тому } A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & 0 \\ 31 & -19 & 3 & -4 \\ -23 & 14 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Перевірку виконаємо множенням (оператор МУМНОЖ).

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & 0 \\ 31 & -19 & 3 & -4 \\ -23 & 14 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Відповідь. } A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & 0 \\ 31 & -19 & 3 & -4 \\ -23 & 14 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Зауваження 4. Якщо у вказаній теоремі на місце одиничної матриці справа від вертикальної риски поставити матрицю В (матриця-стовпець СЛР) то в результаті зведення матриці А до одиничної справа отримаємо матрицю $A^{-1} \cdot B$, в якій знаходиться розв'язок заданої системи.

Тобто $[A|B] \rightarrow [E|A^{-1} \cdot B]$, аналогічно для перетворень із стовпцями отримуємо $\left[\begin{matrix} A \\ B \end{matrix} \right] \rightarrow \left[\begin{matrix} E \\ A^{-1} \cdot B \end{matrix} \right]$. Тому процес знаходження оберненої матриці використовується для розв'язування матричних рівнянь виду $A \cdot X = B$, або для реалізації матричного методу розв'язування систем лінійних рівнянь.

Приклад 5. Розв'язати систему лінійних рівнянь методом Жордана

$$\begin{cases} x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -5 \\ x_1 - 2x_3 + 3x_4 = -4 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_4 = 12 \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 5 \end{cases}$$

Розв'язування. Випишемо матриці А та В.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -2 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & -5 \\ 4 & 3 & -5 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -5 \\ -4 \\ 12 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Оскільки в матриці А всі елементи головної діагоналі рівні нулю, то переставимо перше та друге рівняння місцями, тому що нам потрібно

утворюючи одиничну матрицю, вибирати розв'язні елементи на головній

діагоналі. Отримаємо
$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 + 3x_4 = -4 \\ x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -5 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_4 = 12 \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 5 \end{cases},$$

а матриці А і В

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ 3 & 2 & 0 & -5 \\ 4 & 3 & -5 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -4 \\ -5 \\ 12 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Складемо розрахункові таблиці в Ms Excel

	A	B	C	D	E	F
1	БАЗИС	X1	X2	X3	X4	Bi
2		0	1	-3	4	-5
3		1	0	0	3	-4
4		3	2	0	-5	12
5		4	3	-5	0	5
6		1	0	0	3	-4
7		0	1	-3	4	-5
8		3	2	0	-5	12
9		4	3	-5	0	5
10	X1	1	0	0	3	-4
11		0	1	-3	4	-5
12		0	2	0	-14	24
13		0	3	-5	-12	21
14	X1	1	0	0	3	-4
15	X2	0	1	-3	4	-5
16		0	0	6	-22	34
17		0	0	1	-6	9
18	X1	1	0	0	3	-4
19	X2	0	1	0	-14	22
20		0	0	0	14	-20
21	X3	0	0	1	-6	9
22	X1	1	0	0	0	2/7
23	X2	0	1	0	0	2
24	X4	0	0	0	1	-1 3/7
25	X3	0	0	1	0	3/7
			E			$A^{-1} \cdot B$

- 1) Переставляємо місцями перше та друге рівняння;
- 2) Розв'язувальний елемент $B_6=1$, тому в базис піде X_1 . Формули переходу для першого стовпця нової таблиці. $B_{10}=B_6/B_{\$6}$, $B_{11}=\$B_6*B_7-\B_7*B_6 , $B_{12}=\$B_6*B_8-\B_8*B_6 , $B_{13}=\$B_6*B_9-\B_9*B_6 ;
- 3) Розв'язувальний елемент $C_{11}=1$, тому в базис піде X_2 . Задамо формули переходу для першого стовпця нової таблиці. $B_{14}=\$C_{11}*B_{10}-\$C_{10}*B_{11}$, $B_{15}=B_{11}/\$C_{11}$, $B_{16}=\$C_{11}*B_{12}-\$C_{12}*B_{11}$, $B_{17}=\$C_{11}*B_{13}-\$C_{13}*B_{11}$;
- 4) Розв'язувальний елемент $D_{17}=1$, тому в базис піде X_3 . Формули переходу $B_{18}=\$D_{17}*B_{14}-\$D_{14}*B_{17}$, $B_{19}=\$D_{17}*B_{15}-\$D_{15}*B_{17}$, $B_{20}=\$D_{17}*B_{16}-\$D_{16}*B_{17}$, $B_{21}=B_{17}/\$D_{17}$;
- 5) Розв'язувальний елемент $E_{20}=14$, тому в базис піде X_3 . Формули переходу $B_{22}=(\$E_{20}*B_{18}-\$E_{18}*B_{20})/\$E_{20}$; $B_{23}=(\$E_{20}*B_{19}-\$E_{19}*B_{20})/\$E_{20}$, $B_{24}=B_{20}/\$E_{20}$, $B_{25}=(\$E_{20}*B_{21}-\$E_{21}*B_{20})/\$E_{20}$.

Після чотирьох кроків жорданових виключень отримали зліва матрицю E , а справа матрицю-стовпець $A^{-1} \cdot B$, в якій знаходяться розв'язки системи. Випишемо їх, користуючись строчками останньої таблиці.

$$X_1 = \frac{2}{7}, X_2 = 2, X_3 = \frac{3}{7}, X_4 = -1\frac{3}{7}.$$

IV. Розклад вектора за базисом.

Базисом n - вимірного лінійного простору R^n називається система $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ n лінійно-незалежних векторів. Будь-який вектор цього простору можна розкласти за базисом. Тобто для будь-якого вектора $\vec{b} \in R^n$ знайдуться числа x_1, x_2, \dots, x_n (з яких принаймні одне відмінне від нуля) такі, що $\vec{b} = \vec{a}_1 \cdot x_1 + \vec{a}_2 \cdot x_2 + \dots + \vec{a}_n \cdot x_n$. Останній вираз і є розкладом вектора \vec{b} за базисом $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$.

Приклад 6. Показати, що вектори

$\vec{a} = (1; -4; -1; 2), \vec{a}_2 = (4; 5; 2; -1), \vec{a}_3 = (2; 3; 1; 1), \vec{a}_4 = (1; 2; 1; 4)$ утворюють базис і методом

Жордана - Гауса знайти розклад вектора $\vec{b} = (3; 0; -3; -6)$ за цим базисом.

Розв'язання. Якщо визначник складений з координат векторів $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4$ відмінний від нуля, то вони будуть лінійно-незалежними і утворюватимуть базис простору R^4 . В протилежному випадку – ні.

Складемо визначник (координати векторів записуватимемо в стовпець) та обчислимо його (функція МОПРЕД).

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 & 1 \\ -4 & 5 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -24 \neq 0, \text{ тому вектори } \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4 \text{ утворюють базис. Знайдемо}$$

розклад вектора $\vec{b} = (3; 0; -3; -6)$ за цим базисом. Нехай $\vec{b} = \vec{a}_1 \cdot x_1 + \vec{a}_2 \cdot x_2 + \vec{a}_3 \cdot x_3 + \vec{a}_4 \cdot x_4$

розкладається за базисом $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4$ - де x_1, x_2, x_3, x_4 - невідомі коефіцієнти.

Запишемо даний розклад в координатному вигляді та складемо відповідну систему рівнянь.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot x_1 + \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot x_2 + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot x_3 + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot x_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 = 3, \\ -4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = -3, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 4x_4 = -6. \end{cases}$$

Складемо відповідну таблицю, та виконуючи послідовно кроки перетворення за методом Жордана - Гауса отримаємо невідомі коефіцієнти розкладу.

	A	B	C	D	E	F
1		X1	X2	X3	X4	Bi
2		1	4	2	1	3
3		-4	5	3	2	0
4		-1	2	1	1	-3
5		2	-1	1	4	6
6	X1	1	4	2	1	3
7		0	21	11	6	12
8		0	6	3	2	0
9		0	-9	-3	2	0
10	X1	1	1	0,5	0	3
11		0	3	2	0	12
12	X4	0	3	1,5	1	0
13		0	-15	-6	0	0
14	X1	1	0,25	0	0	0
15	X3	0	1,5	1	0	6
16						
	X4	0	0,75	0	1	-9

17		0	-6	0	0	36
18	X1	1	0	0	0	1,5
19	X3	0	0	1	0	15
20	X4	0	0	0	1	-4,5
21	X2	0	1	0	0	-6

Розпишемо кроки переходу від однієї таблиці до іншої.

1) Розв'язувальний елемент $B_2=1$, тому в базис піде X1. Формули переходу для першого стовпця нової таблиці. $B_6=B_2/B_2$, $B_7=B_2*B_3-B_3*B_2$, $B_8=B_2*B_4-B_4*B_2$, $B_9=B_2*B_5-B_5*B_2$.

2) Розв'язувальний елемент $E_8=2$, тому в базис піде X4. Формули переходу для першого стовпця нової таблиці. $B_{10}=(E_8*B_6-E_6*B_8)/E_8$, $B_{11}=(E_8*B_7-E_7*B_8)/E_8$, $B_{12}=B_8/E_8$, $B_{13}=(E_8*B_9-E_9*B_8)/E_8$.

3) Розв'язувальний елемент $D_{11}=2$, тому в базис піде X3. Формули переходу для першого стовпця нової таблиці. $B_{14}=(D_{11}*B_{10}-D_{10}*B_{11})/D_{11}$, $B_{15}=B_{11}/D_{11}$, $B_{16}=(D_{11}*B_{12}-D_{12}*B_{11})/D_{11}$, $B_{17}=(D_{11}*B_{13}-D_{13}*B_{11})/D_{11}$.

4) Розв'язувальний елемент $C_{17}=-6$, тому в базис піде X2. Формули переходу для першого стовпця нової таблиці. $B_{18}=(C_{17}*B_{14}-C_{14}*B_{17})/C_{17}$, $B_{19}=(C_{17}*B_{15}-C_{15}*B_{17})/C_{17}$, $B_{20}=(C_{17}*B_{16}-C_{16}*B_{17})/C_{17}$, $B_{21}=B_{17}/C_{17}$.

Отже з останньої таблиці $x_1=1,5, x_2=-6, x_3=15, x_4=-4,5$ та розклад вектора $\vec{b}=1,5\vec{a}_1-6\vec{a}_2+15\vec{a}_3-4,5\vec{a}_4$.

V. Застосування методу Жордана - Гауса в задачах економіки.

В економічних дослідженнях для визначення ефективності виробництва досить часто застосовується симплекс-метод, який базується на Жорданових виключеннях [5].

Приклад 7. Задача оптимального виробничого планування. Фірма випускає чотири види продукції А, В, С і D, на виробництво якої витрачає три види ресурсів (наприклад: працю, сировину та обладнання), які вона має

в обмеженій кількості. Норми витрат ресурсів на виготовлення одиниці продукції, їх наявні запаси, а також ціна реалізації одиниці продукції наведені в таблиці:

Ресурси	Норми витрат ресурсів на одиницю продукції				Запаси ресурсів
	A	B	C	D	
1	4	2	2	3	210
2	1	1	2	3	180
3	3	1	2	1	240
Ціна	15	10	15	11	

Математична модель нашої задачі в канонічній формі має вигляд:

$$F = 15x_1 + 10x_2 + 15x_3 + 11x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_5 = 210, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_6 = 180, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + x_7 = 240, \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = \overline{1,7}).$$

Економічна інтерпретація прямої задачі.

Для виробництва чотирьох видів продукції А, В, С, та D використовують три види ресурсів. Відомі наявні запаси ресурсів 210, 180 та 240 од. для 1, 2 та 3-го ресурсу відповідно, а також норми витрат кожного ресурсу для виготовлення продукції А, В, С, та D та ціна реалізації (в останній строчці) відповідно. Необхідно знайти такий план випуску продукції $X^* = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7)$, при якому виручка від реалізації продукції буде максимальною, а витрати ресурсів не перевищуватимуть їх наявних запасів.

Розв'яжемо нашу задачу симплекс-методом користуючись засобами MS Excel. Запишемо всі дані в симплекс-таблицю та виконаємо перехід до наступної таблиці з допомогою кроку симплекс-методом.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				15	10	15	11	0	0	0	
2	БАЗИС	Сібаз	Хібаз	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	θi
3	←X5	0	210	4	2	2	3	1	0	0	52,5
4	X6	0	180	1	1	2	3	0	1	0	180
5	X7	0	240	3	1	2	1	0	0	1	80
6	Δj=Zj-Cj		0	↑-15	-10	-15	-11	0	0	0	

Максимальне по модулю $|\Delta_j| = |z_j - c_j| = 15$, тому до базису включимо змінну X_1 (можна включати X_3). Отже перший стовпець є напрямним. В комірці K3 задамо формулу для обчислення $\theta_1 = C3/D3$. Отримаємо $\theta_1 = 52,5$. Розповсюдимо дану формулу на клітинки K4 та K5. Отримаємо $\min\{52,5; 180; 80\} = 52,5$, тому напрямним є перший рядок, а розв'язувальний елемент таблиці $a_{11} = 4$. Переходимо до наступної таблиці. Для цього задаємо формули для визначення елементів стовпця $X_{i\text{баз}}$ таким чином, щоб розповсюдити їх на всі комірки нової таблиці. В комірці C7 створюємо формулу $a_{01}^{(1)} = C3/D3$. Елемент клітини D3 зафіксували клавішею F4. Отримали 52,5. Нагадаємо, що перехід для обчислення інших елементів наступної таблиці, здійснюється за правилом прямокутника.

Для комірки C8 формула переходу матиме вигляд:

$$a_{02}^{(1)} = \frac{a_{11} \cdot a_{02} - a_{21} \cdot a_{01}}{a_{11}}, \quad \text{а для комп'ютерної резації}$$

C8=(D3*C4-D4*C3)/D3. Створюємо формулу для елемента $a_{03}^{(1)}$ нової таблиці C9=(D3*C5-D5*C3)/D3. Виділяємо утворений стовпець та розповсюджуємо формулу (вправо) на всю таблицю. Таким чином перехід до нової таблиці за допомогою симплекс-методу виконано. Якщо перехід виконано правильно то в напрямному стовпці нової таблиці отримаємо

базисний вектор $a_1^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Знайдемо елементи останнього рядка. Створимо

формулу у клітині C10. C10=СУММПРОИЗВ(B\$7:B\$9;C7:C9).

Розповсюдимо її на клітину D10 та доповнимо -D1. Отримали формулу, яку

розповсюдимо на всі клітини і цим завершено перший крок та отримаємо нову таблицю:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				15	10	15	11	0	0	0	
	БАЗИС	Сібаз	Хібаз	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	θ_i
7	X1	15	52,5	1	0,5	0,5	0,75	0,25	0	0	105
8	$\leftarrow X6$	0	127,5	0	0,5	1,5	2,25	-0,25	1	0	85
9	X7	0	82,5	0	-0,5	0,5	-1,25	-0,75	0	1	165
10	$\Delta_j = Z_j - C_j$		787,5	0	-2,5	$\uparrow -7,5$	0,25	3,75	0	0	

З останньої таблиці, оскільки $\max\{|-2,5|; |-7,5|\} = 7,5$ то стовпчик із змінною X_3 є напрямним і X_3 піде в базис замість X_6 . Знаходимо θ_1 : $K7 := C7/F7$. Розповсюдимо формулу (вниз) на інші дві клітини. Оскільки $\theta_2 = \min\{105; 85; 165\} = 85$ то другий рядок є напрямним, а розв'язувальний елемент $a_{23}^{(1)} = 1,5$. Створюємо формули для переходу у стовпці C:

$C11 = a_{01}^{(2)} = (\$F\$8 * C7 - \$F\$7 * C8) / \$F\8 ; $C12 = a_{02}^{(2)} = C8 / \$F\$8$; $C13 = a_{03}^{(2)} = (\$F\$8 * C9 - \$F\$9 * C8) / \$F\8 . Виділяємо утворені в стовпці C формули та розповсюджуємо їх на всі клітини таблиці і завершуємо перехід створенням формули в останньому рядку. В результаті отримаємо таблицю:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				15	10	15	11	0	0	0	
	БАЗИС	Сібаз	Хібаз	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	θ_i
11	$\leftarrow X1$	15	10	1	1/3	0	0	1/3	-1/3	0	30
12	X3	15	85	0	1/3	1	1,5	-1/6	2/3	0	255
13	X7	0	40	0	-2/3	0	-2	-2/3	-1/3	1	
14	$\Delta_j = Z_j - C_j$		1425	0	$\uparrow 0$	0	11,5	2,5	5	0	

Оскільки всі оцінки в останньому рядку третьої таблиці невід'ємні, то це означає, що отриманий розв'язок оптимальний $F_{\max} = 1425$ і

$X_{opt}^{(1)} = (10; 0; 85; 0; 0; 0; 40)$. Оскільки оцінка в останньому рядку для змінної X_2 дорівнює нулю та їй відповідає небазисний стовпець, то це означає, що існує альтернативний розв'язок. Знайдемо θ_i користуючись напрямним стовпцем X_2 . $\theta_1 = 30$, $\theta_2 = 255$. θ_1 \min тому напрямним буде перший рядок (розв'язувальний елемент $a_{12}^{(2)} = \frac{1}{3}$).

Задамо формули для елементів першого стовпця та перейдемо до наступної симплекс-таблиці:

$$C15 = a_{01}^{(3)} = C11 / \$E\$11; \quad C16 = a_{02}^{(3)} = (\$E\$11 * C12 - \$E\$12 * C11) / \$E\$11;$$

$$C17 = a_{03}^{(3)} = (\$E\$11 * C13 - \$E\$13 * C11) / \$E\$11;$$

$$C18 = \text{СУММПРОИЗВ}(\$B\$15:\$B\$17; C15:C17). \quad \text{Отримаємо:}$$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				15	10	15	11	0	0	0
	БАЗИС	Сібаз	Хібаз	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
15	X2	10	30	3	1	0	0	1	-1	0
16	X3	15	75	-1	0	1	5,5	-0,5	1	0
17	X7	0	60	2	0	0	-2	0	-1	1
18	$\Delta_j = Z_j - C_j$		1425	0	0	0	11,5	2,5	5	0

З цієї таблиці отримаємо другий оптимальний розв'язок :

$$X_{opt}^{(2)} = (0; 30; 75; 0; 0; 0; 60). \quad \text{В нижніх рядках останніх двох таблиць (стовці } X_5,$$

X_6, X_7) оптимальний розв'язок двоїстої задачі $Y_{opt} = (2,5; 5; 0)$ і

$$Y_{min} = F_{max} = 1425, \quad \text{за першою теоремою двоїстості.}$$

Проведемо економічний аналіз першого оптимального плану (Для другого аналогічно).

$X_1 = 10$ – означає, що продукція А випускається в кількості 10 одиниць;

$X_2 = 0$ – означає, що продукція В не випускається;

$X_3 = 85$ – означає, що продукція С випускається в кількості 85 одиниць;

$X_4 = 0$ – означає, що продукція D не випускається;

$X_5 = 0$ – означає, що ресурс 1 використовується повністю;

$X_6 = 0$ – означає, що ресурс 2 використовується повністю;

$X_7 = 40$ – означає, що ресурс 3 використовується частково, утворюючи залишок у розмірі 40 од.

Отже з допомогою засобів Microsoft Excel можна отримати повний розв'язок оптимізаційної задачі лінійного програмування, а також двоїстої задачі, що дає змогу проводити економічний аналіз та шукати додаткові характеристики.

Переваги застосування електронних таблиць Ms Excel при реалізації методу Жордана – Гауса на заняттях з вищої математики та лінійного програмування:

1. Процес розв'язування займає лічені хвилини в порівнянні з ручним підрахунком .
2. Паралельно добре засвоюється теоретичний матеріал.
3. Виробляються:
 - навички реалізації алгоритмічних процедур;
 - вміння формулювати навчальну задачу, планувати діяльність щодо її розв'язування;
 - вміння добирати та використовувати готові програмні засоби (математичні пакети прикладних програм);
 - вміння складати програми для розв'язування типових навчальних задач;
 - навички володіння основами логічного програмування;
 - вміння добирати ефективний метод для розв'язування поставленої задачі.
4. Можна за досить короткий час скласти систему контрольних завдань для проведення тематичного та підсумкового контролю.
5. Досить великий спектр застосування в методах розв'язання задач лінійного програмування.

Література

1. Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика для економістів-Київ: ЦУЛ, 2002. - 400 с.
2. Вища математика: Навч.-метод. посібник для сам ост. Вивч. дисц./ К.Г. Валєєв, І.А.Джалладова, О.І. Лютий та ін. - Вид. 2-ге перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 606 с.
3. Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Чисельні методи математики: Посібник для самоосвіти вчителів. - К.: Рад. шк., 1984. - 206 с.

4. Гусак А.А., Гусак Г.М. Справочник по высшей математике: Справ. - Мн.: Наука і техніка, 1991. - 480 с.

5. Листопад В.В. Реалізація симплекс-методу для розв'язання економічних задач оптимізації з допомогою Microsoft Excel.//Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.- Випуск 19: збірник наукових праць/ за ред. В.Д.Сиротюка .- К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. - с.211-216.